



ukrzoovet.com.ua

Реєстраційне посвідчення
№ АВ-02401-01-11

ФЕНЗОЛ - 250 (ТАБЛЕТКИ)

листівка-вкладка

Опис

Таблетки білого або сіруватого кольору.

Склад

Таблетка (1 г) містить діючу речовину:

фенбендазол - 250 мг.

допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, цукрова пудра, кросповідон, кальцію стеарат, аеросил.

Фармакологічні властивості

АТСvet код QP52, антигельмінтні препарати, (QP52AC13, фенбендазол).

Діюча речовина - фенбендазол (група бензімідазолів) гальмує полімеризацію білків тубулінів у мікротубуліни, знижує активність енергетичних ферментів, уповільнює метаболізм у гельмінтів, внаслідок чого порушується засвоєння поживних речовин (аденозинтрифосфornoї кислоти та глюкози), знижуються мітохондріальні реакції, настає повне виснаження і параліч паразитів.

Препарат Фензол – 250 (таблетки) практично нетоксичний для тварин, ембріотоксичні і тератогенні властивості не встановлені.

Фенбендазол володіє овоцидною дією. Ефективний проти шлунково-кишкових та легневих нематод, у збільшеній дозі - проти трематод і цестод тварин.

Застосування

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, м'ясоїдних тварин, хутрових звірів, курей, гусей при гельмінтозах, викликаних шлунково-кишковими та легневими нематодами, трематодами та цестодами (*Ancylostoma*, *Ascaris*, *Bunostomum*, *Cooperia*, *Dictyocaulus*, *Haemonchus*, *Metastrongylus*, *Nematodirus*, *Ostertagia*, *Oesophagastomum*, *Oxyuris*, *Protostrongylus*, *Parascaris*, *Strongyloides*, *Stephanurus*, *Toxocara*, *Toxascaris*, *Trichuris*, *Trichostrongylus*, *Uncinaria*, статевозрілих трематод *Dicrocoelium lanceatum*, і деякими видами цестод *Moniezia expansa*, *M. benedeni*, *Thysaniezia giardi*, *Taenia spp.*).

Дозування

Перорально у подрібненому вигляді в суміші з кормом або безпосередньо на корінь язика у дозах:

Вид тварин, птиці	Гельмінтози	Кратність введення	Доза Фензол-250 (таблетки), табл. /10 кг маси тіла
Велика рогата худоба	Диктіокаульози, стронгілятози, стронгілоїдоз	Одноразово	0,4
	Дикроцеліози	Одноразово	1,5
	Цистицеркози	три доби поспіль	1
Вівці, кози	Протостронгілози, стронгілятози, стронгілоїдоз, диктіокаульоз, монієзіїз	Одноразово	0,5
	Трихуроз	Дві доби поспіль	0,5
	Дикроцеліоз	дві доби поспіль	1
Свині	Аскароз	два рази на добу	0,5

	Езофагостомоз, стронгілоїдоз	Одноразово	0,4
	Трихуроз	два рази на добу	1,2
Кони	Параскароз, оксіуроз	Одноразово	0,5
	Стронгілоїдоз	два рази на добу	1,2
М'ясоїдні тварини (собаки, коти, хутрові звірі)	Нематодози	Одноразово	2,0
Кури	Аскаридіоз, гетеракідоз	дві доби поспіль	0,4
Гуси	Амідостомоз, дрепанідотеніоз, Гіменолепідідози	Одноразово	1,5

Протипоказання

Підвищена чутливість до фенбендазолу.

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 14 діб після останнього застосування препарату, молоко в їжу людям використовують через 4 доби. До вказаного терміну молоко та м'ясо згодують непродуктивним тваринам або утилізують.

Форма випуску

Таблетки упаковані у картонні коробки по 24 шт., банки із полімерних матеріалів 100 шт.

Зберігання

В упакованні виробника за температури від 2 до 30 °С та відносній вологості не більше 75%.

Термін придатності - 2 роки.

Власник реєстраційного посвідчення

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,

Тел. 0800211201

Виробник готового продукту

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua