



Додаток 2
до реєстраційного посвідчення
AB-01353-01-10

АЛЬБЕНДАЗОЛ-Л 10%

(порошок для перорального застосування)

листівка-вкладка

Опис

Сипкий однорідний порошок зі слабким специфічним запахом, кремово - білого або сіро - білого, або синьо - білого кольору.

Склад

100 г препарату містить діючу речовину:
альбендазол -10 г.

Допоміжні речовини: цукрова пудра, крохмаль кукурудзяний, кальцію карбонат.

Фармакологічні властивості

ATCvet класифікаційний код QP52 - Антигельмінтні ветеринарні препарати, QP52AC11- Альбендазол.

АЛЬБЕНДАЗОЛ-Л 10% - препарат широкого спектру дії, який призначений для лікування м'ясоїдних тварин та курей декоративних курей при інвазійних паразитарних захворюваннях, спричинених нематодами, цестодами та трематодами.

Альбендазол блокує полімеризацію бета-тубуліну, в результаті чого порушується надходження і внутрішньоклітинне транспортування поживних речовин та обмін субстратів речовин (аденозинтрифосфornoї кислоти та глюкози), а також сповільнюються мітохондріальні реакції через гальмування фумаратредуктази, що призводить до зменшення кількості глікогену та загибелі паразитів від виснаження.

Біодоступність препарату АЛЬБЕНДАЗОЛ-Л 10% низька (близько 30 %). Погано абсорбується зі шлунково-кишкового тракту (до 5 %), у незміненому вигляді не визначається у плазмі крові, оскільки швидко перетворюється у печінці в первинний метаболіт – альбендазолу сульфоксид, який також має протигельмінтні властивості. Час досягнення максимальної концентрації альбендазолу сульфоксиду складає 2-5 год.

Зв'язується з білками плазми крові на 70%. Альбендазолу сульфоксид у печінці перетворюється в альбендазолу сульфон (вторинний метаболіт) та інші окиснені продукти. Період напіввиведення (T_{1/2}) альбендазолу сульфоксиду – 8-12 годин. Виводиться у вигляді різних метаболітів з жовчю через кишечник або із сечею.



Застосування

Дегельмінтизація собак і котів при шлунково-кишкових та легеневих нематодозах травного каналу та цестозах:

нематоди - *Toxocara canis* (токсокароз), *Toxascaris leonina* (токсаскароз), *Ancylostoma* spp. (анкілостомоз), *Uncinaria stenocephala* (унцинаріоз);

цестоди - *Dipylidium caninum* (дипілідіоз), *Taenia* spp. (тенідози).

Дегельмінтизація курей декоративних порід при ураженні нематодами: *Ascaridia galli* (аскаридіоз), *Heterakis gallinarum* (гетеракоз) та змішаних інвазіях.

Дозування

Перорально з кормом, одноразово у дозі, г/10 кг маси тіла:

Вид тварин	Доза препарату
Собаки, коти та хутрові звірі	2,5
Кури декоративних порід	1,0 два дні поспіль

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до альбендазолу.

Застереження

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не застосовувати препарат тваринам під час вагітності та під час лактації.

Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

У дозах, що перевищують терапевтичні в 5 і більше разів, альбендазол може викликати ознаки інтоксикації у тварин: діарея, анорексія, атаксія, кома, підвищення температури тіла.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Форма випуску

Ламіновані або поліетиленові пакети по 10, 100 та 500 г.

Зберігання

У сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 2 °С до 30 °С.

Термін придатності - 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1

www.ukrzoovet.com.ua

Виробник готового продукту:

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1

www.ukrzoovet.com.ua

Для застосування
у ветеринарній медицині

N

