



Додаток 2
до реєстраційного посвідчення
AB-02400-01-11

АЛЬБЕНДАЗОЛ - 250

(таблетки)

листівка-вкладка

Опис

Таблетки білого або сіруватого кольору.

Склад

Таблетка масою 1 г містить діючу речовину:
альбендазол - 250 мг.

Допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, цукрова пудра, кросповідон, кальцію стеарат, аеросил.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AC11, альбендазол).

Альбендазол належить до групи бензімідазолів, які гальмують полімеризацію тубуліну в мікротубуліні, в результаті чого порушується надходження і внутріклітинне транспортування поживних речовин і обмінних речовин (аденозинтрифосфornoї кислоти і глюкози), а також знижуються мітохондріальні реакції шляхом гальмування фумаратредуктази, що викликає загибель паразитів.

При пероральному введенні препарату альбендазол всмоктується у травному каналі та проникає в органи та тканини; із організму виводиться в основному сечею та фекаліями. Біодоступність альбендазолу низька. Час досягнення максимальної концентрації альбендазол сульфоксиду складає 2-5 год. Зв'язується з білками плазми на 70%.

Виводиться жовчю у вигляді активного метаболіту альбендазол сульфоксиду, лише невелика його кількість виводиться сечею.

Застосування

Профілактика та лікування великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, собак, курей при інвазійних захворюваннях:


велика рогата худоба, вівці і кози:

шлунково-кишкові нематоди: *Haemonchus contortus*, *Ostertagia spp*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus*;

легеневі нематоди: *Dictyocaulus viviparus*;

цестоди: *Moniezia expansa*;

трематоди: *Fasciola hepatica* (дорослі).



свині:

шлунково-кишкові нематоди: *Hyostrongylus rubidus*, *Strongyloides ransomi*, *Oesophagostomum dentatum*, *Ascaris suum*, *Trichuris suis*.

собаки:

шлунково-кишкові нематоди: *Toxocara spp.*, *Toxascaris spp.*, *Uncinaria spp.*, *Ancylostoma spp.*, *Trichuris spp.*,

цестоди: *Taenia solium*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllbothrium latum*;

трематодами: *Opisthorchis felineus*.

кури:

нематоди: *Ascaridia galli*.

Дозування

Перорально з кормом одноразово (свині - дворазово, з інтервалом в 24 години) у дозах (табл./10 кг маси тіла):

велика рогата худоба - 0,25 (при трематодозах 0,5);

вівці, кози - 0,2 (при трематодозах 0,25);

свині - 0,5;

собаки - 0,5 (при трематодозах 1,0);

кури - 0,5.

Протипоказання

Підвищена чутливість до альбендазолу.

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 14 діб після останнього застосування препарату, молоко в їжу людям використовують через 4 доби. До вказаного терміну молоко та м'ясо згодовують непродуктивним тваринам або утилізують.

Форма випуску

Таблетки упаковані у картонні коробки по 24 шт, поліетиленові банки 100 шт.

Зберігання

В упакованні виробника за температури від 2 °С до 30 °С та відносній вологості не більше 75%.

Термін придатності - 2 роки.

Власник реєстраційного посвідчення

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 03040, м.Київ, вул. Васильківська, 16,

0 800 211 201

Виробник готового продукту

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 03040, м.Київ, вул. Васильківська, 16,

0 800 211 201

www.ukrzoovet.com.ua

Для застосування
у ветеринарній медицині

А

