



ukrzoovet.com.ua

Регистрационное
свидетельство
№ АВ-01354-01-10

АМПРОЛИУМ 22%
(порошок для перорального применения)
листок-вкладыш

Описание

Порошок белого или желтоватого цвета без запаха.

Состав

100 г препарата содержат действующее вещество:
ампролиуму гидрохлорид - 22 г.

Вспомогательные вещества: сахарная пудра.

Фармакологические свойства

ATCvet QP51, антипротозойные ветеринарные препараты (QP51AX09, ампролиум)

Активнодействующее вещество препарата, ампролиума гидрохлорид, подавляет развитие эймерий на стадии шизогонии первой и второй генерации. Действие ампролиума обусловлена тем, что его химическая структура близка к тиамину (витамину В₁), необходимого для жизнедеятельности эймерий. В клетках паразитов ампролиум нарушает углеводный обмен, что приводит к их гибели.

Ампролиум почти не проникает через клеточные мембраны слизистой оболочки кишечника птицы и млекопитающих, поэтому препарат практически нетоксичен при использовании в терапевтических дозах. Основная часть ампролиума (до 97%) выводится из организма в неизменном виде. Препарат подавляет формирование противококцидийного иммунитета, совместим с витаминами и кормовыми добавками, которые применяются в птицеводстве.

Применение

Профилактика и лечение кур, индеек и кроликов при поражении эймериями:

у кур - *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. praecox*, *E. maxima*, *E. brunetti*, *E. mitis*, *E. mivati*;

в индюков - *Eimeria adenoides*, *E. Gallapavonis*, *E. meleagrimitis*;

у кроликов - *Eimeria stiedae*, *E. perforans*, *E. magna*.

Дозировка

Препарат скармливают с кормом или выпаивают с питьевой водой:

| Вид животных | Профилактическая доза | Лечебная доза |
|---------------------|---|---|
| Куры | 1,4 г/2 л воды или 1,4 г/2 кг корма в течение 3-5 суток | 1,4 г/1 л воды или 1,4 г/1 кг корма в течение 3-5 суток |
| Индюки | 1,4 г/2 л воды или 1,4 г / 2 кг корма в течение 3-5 суток | 1,4 г/1 л воды или 1,4 г/1 кг корма в течение 3-5 суток |
| Кролики | 1,4 г/20-25 кг массы тела в течение 14 суток | 1,4 г/5-10 кг массы тела в течение 3-5 суток, один раз в сутки |

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ампролиуму, болезни печени, почечная недостаточность.

Предостережение

Убой кроликов и птицы на мясо разрешается через 5 суток после последнего применения препарата. При убое до указанного срока мясо скармливают непродуктивным животным или утилизируют в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.

Персонал, работающий с препаратом, должен соблюдать основные правила гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами.

Во время работы с препаратом не курить, не пить и не принимать пищу. После окончания работы тщательно вымыть руки и лицо с мылом, рот прополоскать водой. Тару из-под препарата запрещается использовать для пищевых целей.

Форма выпуска

Двухслойные пакеты или банки из полимерных материалов по 1,4; 10,0, 100,0 и 500,0 г.

Хранение

В сухом и защищенном от света месте при температуре от 10 до 25°C.

Срок годности - 2 года.

Владелец регистрационного удостоверения:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпочтач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua

Производитель готового продукта:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпочтач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua