



ukrzoovet.com.ua

Реєстраційне
посвідчення
№ АВ -01922-03-10

АВЕРСЕКТ

(розчин для зовнішнього застосування)

листівка - вкладка

Опис

Рідина жовтуватого кольору із специфічним запахом.

Склад

100 мл препарату містить діючу речовину:

аверсектин С - 0,2 г.

Допоміжні речовини: головна фракція етилового спирту, поліетиленгліколь-400 (поліетиленоксид-400), неолон або синтанол, лимонна кислота, гліцерин, ароматизатор, вода очищена..

Фармакологічні властивості

АТС vet QP54, ендектоциди (QP54AA, авермектини).

Діюча речовина препарату аверсектин С - комплекс природних авермектинів, які продукуються непатогенним ґрунтовим грибом *Streptomyces avermitilis*. Авермектини – це природні високоспецифічні нейротоксини, які в мікродозах проникають у організм ектопаразитів і незворотно діють на їх нервову систему. Аверсектин С посилює продукування нейтромедіатора гама-аміномасляної кислоти (ГАМК), яка зв'язується з спеціальними рецепторами нервових закінчень, блокуючи нервові імпульси, що викликає параліч і загибель паразита. Препарат малотоксичний для ссавців, у рекомендованих дозах не виявляє сенсibiliзуючої, ембріотоксичної, тератогенної та мутагенної дії.

Застосування

Профілактика і лікування великої рогатої худоби, овець, свиней, птиці (курей) при ураженні ектопаразитами:

- кліщами - збудниками псороптозу (*Psoroptes bovis*, *P. ovis*);
- кліщами – збудниками демодекозу (*Demodex bovis*, *D. phylloides*, *D. ovis*);
- іксодовими кліщами родини *Ixodidae*;
- курячими кліщами (*Dermanyssus gallinae*);
- вошами (*Haematopinus eurysternus*, *H. suis*, *Linognathus vituli*, *L. ovillus*);
- блохами (*Vermipsylla alacurt*, *V. dorcadia*);
- мухами (*Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*, *Haematobia stimulans* та ін.).

Дозування

Обробку тварин проводять методом обприскування або купання робочим розчином препарату.

Вид тварин	Робочий розчин	Кратність обробок
Велика рогата худоба	5 мл препарату / 1 л води	двічі з інтервалом 7 діб
Вівці	8 мл препарату / 1 л води для нестрижених тварин, 5 мл на 1 л води для стрижених	двічі з інтервалом 7 діб, профілактично – одноразово
Свині	5 мл препарату / 1 л води	двічі з інтервалом 14 діб
Кури	30 мл препарату / 1 л води	одноразово

Робочий розчин препарату наносять на шерсть тварин та пір'я курей, витримують 5 хвилин (експозиція) і добре змивають теплою водою. Робочі розчини не зберігаються.

Протипоказання

Не застосовувати для обробки ослаблених, втомлених та хворих тварин на інфекційні захворювання тварин!

Не застосовувати для обробки корів у період лактації, а також у останній місяць тільності (за 28 доби до отелу)!

Застереження

Уникати попадання препарату в очі та на шкіру. Робочий розчин повинен бути використаний протягом 24 годин після приготування. Препарат токсичний для бджіл.

Забій великої рогатої худоби, овець та свиней на м'ясо дозволяється через 7 днів після обробки тварин. При вимушеному забої м'ясо використовують для годівлі м'ясоїдним тваринам.

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Уникати попадання препарату в очі та на шкіру. Порожні флакони з-під препарату не використовувати для харчових цілей.

Форма випуску

Скляні флакони по 10 мл, 100 мл; полімерні каністри по 900 мл, 4,8 л.

Зберігання

Сухе темне місце при температурі від мінус 10°C до 20°C. Не допускається зберігання препарату разом з харчовими продуктами та кормами для тварин.

Термін придатності - 2 роки .

Власник реєстраційного посвідчення

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,
Тел. 0800211201

Виробник готового продукту

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,
Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua