



ЦИПРОЛАК (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) листівка-вкладка

Опис

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, білого або майже білого кольору, з двоопуклою поверхнею, без запаху, масою 0,15 та 0,5 г.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину: ципрофлоксацину гідрохлорид у перерахунку на ципрофлоксацин – 100,0 мг. Допоміжні речовини: лактоза, крохмаль кукурудзяний, целюлоза мікрокристалічна, лактулози сироп, кремнію діоксид колоїдний безводний, кальцію стеарат, гіпромелоза, титану діоксид, макрогол 6000, тальк.

Фармакологічні властивості

ATCvet класифікаційний код: QJ01 – Антибактеріальні засоби для системного застосування. QJ01MA02 – Ципрофлоксацин.

Ципрофлоксацин – синтетичний антибактеріальний препарат групи фторхінолонів з широким спектром дії.

Ципрофлоксацин активний щодо грамнегативних (*E. coli*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Enterobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *Serratia* spp., *Camphylobacter* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Yersinia* spp., *Vibrio* spp., *Aeromonas* spp., *Haemophilus* spp., *Brucella* spp., *Mycobacterium* spp.) та грампозитивних (*Staphylococcus* spp. (включаючи пеніциліназо-продукуючі та метицилін-стійкі штами) *Streptococcus* spp., *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium* spp. та інші) мікроорганізмів, а також до нього чутливі мікоплазми (*Mycoplasma* spp.) та хламідії (*Chlamydia trachomatis*).

Механізм дії ципрофлоксацину полягає в інгібуванні бактеріальної ДНК-гірази (топоізомерази II), що впливає на реплікацію спіралі ДНК та призводить до порушення синтезу білка і загибелі мікроорганізму.

Після перорального застосування ципрофлоксацин всмоктується переважно в дванадцятипалій і порожній кишці, біодоступність у собак становить 50–85%, у котів – 33%. Максимальна концентрація в плазмі крові досягається через 60–90 хв. Об'єм розподілу – 2–3 л/кг. Зв'язування з білками плазми незначне (20–40%). Ципрофлоксацин добре проникає в органи та тканини (включаючи тканини, багаті жирами), кістки, плевру, очеревину, лімфу, очну рідину і плаценту. Приблизно через 2 години після перорального застосування він виявляється в тканинах і рідинах організму в концентраціях, що у багато разів перевищують його концентрацію в сироватці крові. Ципрофлоксацин метаболізується в печінці.

Період напіввиведення з плазми після перорального застосування становить від 3 до 5 годин. Ципрофлоксацин виводиться з організму переважно у незміненому вигляді та у вигляді метаболітів, менш активних, ніж сам ципрофлоксацин, головним чином нирками (50–70%). Значна кількість ципрофлоксацину виводиться також із жовчю та фекаліями (до 30%), у лактуючих тварин також і з молоком.

Застосування

Лікування собак та котів за хронічних і гострих захворювань органів дихання, травного каналу, сечостатевої системи, шкіри та м'яких тканин, кісток і суглобів, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до ципрофлоксацину.

Дозування

Дозування та кратність введення слід коригувати за необхідності для кожної тварини та кожного випадку індивідуально.

ЦИПРОЛАК таблетки застосовують тваринам індивідуально перорально з невеликою кількістю корму (ласощів) або вводять на корінь язика в дозах: коти – 5 мг ципрофлоксацину на 1 кг маси тіла двічі на добу (через 12 годин) протягом 3–7 діб;

собаки – 5–10 мг ципрофлоксацину на 1 кг маси тіла двічі на добу (через 12 годин) протягом 3–7 діб.

Одноразові дози препарату ЦИПРОЛАК залежно від маси тіла тварини та модифікації таблеток представлені в таблиці:

Маса тіла тварини (кг)	Кількість таблеток (одноразова доза)	
	ЦИПРОЛАК для котів і собак дрібних порід (15 мг ципрофлоксацину в таблетці)	ЦИПРОЛАК для собак (50 мг ципрофлоксацину в таблетці)
До 3 кг	1	–
>3–6	2	–
>6–10	3	1
>10–20	–	2
>20–30	–	3
>30–40	–	4
>40	1 таблетка «ЦИПРОЛАК таблетки для собак» (50 мг ципрофлоксацину) в таблетці на кожні додаткові 10 кг маси тіла тварини	



Курс лікування може бути відкорегований лікарем ветеринарної медицини залежно від перебігу захворювання, реакції на ліки та розвитку будь-яких побічних ефектів.

Котам препарат слід застосовувати з великою обережністю та під особливим контролем, оскільки це може викликати анорексію.

Протипоказання

Не застосовувати за підвищеної чутливості до компонентів препарату.

Не застосовувати тваринам із вираженими порушеннями розвитку хрящової тканини, а також із тяжкою нирковою або печінковою недостатністю.

Не застосовувати тваринам з ураженнями нервової системи, що супроводжуються судомами.

Не застосовувати кошенятам молодше 8 місяців, цуценям молодше 12 місяців (цуценям великих порід – молодше 18 місяців).

Не застосовувати з профілактичною метою.

Не застосовувати у разі виявлення стійких штамів патогенних бактерій, резистентних до хінолонів.

Не застосовувати самкам в період вагітності та лактації.

Не застосовувати одночасно з тетрациклінами, макролідами, лінкозамидами, циклоспоринами, хлорамфеніколом та нестероїдними протизапальними засобами

Застереження

Побічна дія

Побічних явищ і ускладнень у собак і котів за застосування препарату відповідно до листівки-вкладки, як правило, не спостерігається.

У випадку підвищеної індивідуальної чутливості тварини до фторхінолонів і за появи ознак побічної дії (свербіж, нудота, блювання, тремор м'язів) використання препарату припиняють і проводять десенсибілізуючу терапію.

Може спричиняти проблеми у розвитку кісток/суглобів у молодих тварин, що ростуть, включаючи собак великих порід віком до 18 місяців.

Особливі застереження при використанні

Фторхінолони слід використовувати для лікування клінічних станів, за яких протимікробні засоби інших класів виявилися або можуть виявитися неефективними.

Препарат слід застосовувати лише з урахуванням результатів тестувань чутливості мікроорганізмів-збудників до ципрофлоксацину.

Не допускайте зневоднення тварин під час лікування цим препаратом через можливий ризик розвитку кристалурії.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з тетрациклінами, макролідами, лінкозамидами, циклоспоринами, хлорамфеніколом та нестероїдними протизапальними засобами.

Препарати, що містять у своєму складі катіони Mg^{2+} , Al^{3+} , Ca^{2+} , у разі одночасного застосування із ципрофлоксацином знижують його біодоступність. У зв'язку з цим ципрофлоксацин слід застосовувати або за 2 години до, або принаймні через 4 години після прийому цих препаратів.

Під час одночасного застосування з теofilіном (еуфіліном), ципрофлоксацин може підвищити рівень теofilіну в крові.

За одночасного введення препарату із аміноглікозидами, цефалоспоринами третього покоління та пеніцилінами широкого спектру дії може виникнути синергізм по відношенню до деяких бактерій (*Pseudomonas aeruginosa* та бактерій родини *Enterobacteriaceae*).

Препарат не рекомендують змішувати з іншими лікарськими засобами.

Передозування

За передозування лікарського ветеринарного препарату у тварин може спостерігатися зниження апетиту, пригнічений стан, блювання. У цьому випадку слід припинити застосування препарату та призначити симптоматичне лікування. За необхідності можна застосувати антациди, що містять алюміній або магній, або активоване вугілля для зниження всмоктування ципрофлоксацину.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих під час роботи з ветеринарними препаратами. Особам із відомою гіперчутливістю до фторхінолонів слід уникати будь-якого контакту з продуктом. У разі випадкового проковтування негайно зверніться до лікаря та покажіть йому листівку-вкладку з упаковки. Вимийте руки після роботи з продуктом. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх великою кількістю води.

Форма випуску

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, масою 0,15 і 0,50 г по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці.

Зберігання

У сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 0 до 25 °С.

Термін придатності – 4 роки.

Рекомендований відпуск за рецептом.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту:

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка, Бучанський р-н.,

Київська обл., 08030, Україна.

www.ukrzoovet.com.ua

