



## **ЕНІМІКОЛ** **(концентрат емульсії для зовнішнього застосування)** **листівка-вкладка**

### **Опис**

Густа прозора рідина жовто-коричневого кольору.

### **Склад**

1 мл препарату містить діючу речовину:

енілконазол – 100 мг

Допоміжні речовини: твін 20 (полісорбат 20), сорбітану моноолеат (спан 80).

### **Фармакологічні властивості**

**АТС vet класифікаційний код: QD01A – Протигрибкові ветеринарні препарати для місцевого застосування. QD01AC90 – Енілконазол.**

Енілконазол є синтетичним протигрибковим (протимікозним) засобом широкого спектру дії з групи імідазолів, активний проти більшості звичайних дерматофітів (у тому числі, збудників трихофітії та мікроспорії) та різних інших грибів і дріжджів.

Механізм дії енілконазолу заснований на вибіркового інгібуванні біосинтезу ергостеролу – основного компонента мембрани клітин грибів та дріжджів, що призводить до незворотних змін у клітинних стінках, тим самим забезпечуючи протигрибковий (протимікозний) ефект.

Препарат після локального застосування має низьку системну доступність. Залишки енілконазолу в тканинах організму тварин майже відсутні і відносно високі в печінці. Виведення з тканин організму та плазми крові відбувається з періодом напіврозпаду від 12 до 16 годин. Енілконазол метаболізується та виводиться, в основному, із сечею та фекаліями. Виділення з молоком у корів дуже обмежене.

### **Застосування**

Для лікування великої рогатої худоби, коней, собак та котів за дерматомікозів, спричинених патогенними грибами: *Trichophyton verrucosum* *Trichophyton mentagrophytes* *Trichophyton equinum* *Microsporum canis* *Microsporum gypseum*.

### **Протипоказання**

Не застосовувати тваринам з підвищеною індивідуальною чутливістю до компонентів препарату.

Не використовувати препарат перорально чи парентерально.

### **Дозування**

Препарат застосовують тваринам зовнішньо у вигляді 0,2% емульсії. Робочу емульсію препарату готують шляхом змішування 1 частини препарату та 50 частин теплої води (10 мл препарату розбавляють у 500 мл теплої води)

Курс лікування становить 4 обробки з інтервалами 3–4 доби.

У тяжких випадках лікування може бути продовжене за призначенням лікаря ветеринарної медицини.

Перед обробкою забруднені ділянки шкіри на тілі тварини очищають, кірочки видаляють за допомогою жорсткої щітки, змоченої у робочій емульсії препарату. Рекомендується змочувати всю поверхню тіла тварини вже при першій обробці, щоб ліквідувати невиявлені вогнища захворювання.

Велику рогату худобу та коней мийть робочою емульсією, використовуючи обприскувачі, або поливаючи зі шланга.



Собакам і котам робочу емульсію слід ретельно втирати в напрямку, протилежному росту волосся, щоб шкіра була достатньо зволожена. Тварин довгошерстих порід рекомендується попередньо постригти.

### **Передозування**

Невідомо. Енілконазол у вигляді емульсії 2 мг/мл добре переноситься.

### **Застереження**

#### *Побічна дія*

Побічних явищ та ускладнень за застосування препарату відповідно до листівки-вкладки зазвичай не спостерігається.

У гіперчутливих тварин можливі алергічні реакції.

У рідкісних випадках спостерігалися ознаки розладу травлення (анорексія, слиновиділення, блювання), нервової системи (атаксія, летаргія), дуже рідко повідомлялося про ураження шкіри (свербіж, алопеція).

#### *Особливі застереження при використанні*

Перед використанням препарат необхідно розвести у воді.

Тільки для зовнішнього застосування.

Під час застосування робочої емульсії необхідно запобігати потраплянню її в очі, рот та ніс тварини.

*Використання під час вагітності, лактації*

Без обмежень.

#### *Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії*

Не слід застосовувати одночасно з іншими протигрибковими (протимікозними) лікарськими засобами для зовнішнього застосування.

#### *Спеціальні застереження*

Для запобігання повторного зараження тварин приміщення, де вони утримувалися, бажано продезінфікувати; речі, які можуть бути інфіковані (упряж, нашійники, будки, кошики, інвентар для прибирання і таке ін.), слід промити в робочій емульсії препарату або обробити нею чи іншими фунгіцидними засобами.

Період виведення (каренція)

М'ясо – нуль діб, молоко – нуль діб.

#### *Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу*

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися загальних правил гігієни та безпеки, прийнятих під час роботи з ветеринарними препаратами.

Обробку тварин необхідно проводити в гумових рукавичках та уникати прямого контакту з препаратом та робочою емульсією.

У разі випадкового потрапляння препарату або робочої емульсії на шкіру або в очі ретельно промийте їх проточною водою.

У разі випадкового проковтування промийте рот великою кількістю проточної води та зверніться до лікаря.

Під час роботи з препаратом не дозволяється курити, пити та вживати їжу.

Після закінчення роботи слід ретельно вимити руки теплою водою з милом, вимити та просушити рукавички.

### **Форма випуску**

Флакони скляні або полімерні по 10 та 100 мл в пачці або без пачки, каністри полімерні по 1 л.

### **Зберігання**

У сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності – 3 роки. Термін придатності після першого відкриття первинної упаковки – 3 місяці, за умови зберігання у щільно закритій тарі.

Робочу емульсію препарату використовують впродовж 24 годин.

### **Для застосування у ветеринарній медицині!**

#### **Власник реєстраційного посвідчення**

#### **та виробник готового продукту:**

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка,

Бучанський р-н., Київська обл.,

08030, Україна.

