



ukrzoovet.com.ua

Реєстраційне посвідчення
№ АВ -02571-01-14

ЕСТРОФАЛАН

листівка-вкладка

Опис

Розчин для ін'єкцій.

Склад:

1 мл препарату містить:

клопростенолу натрієвої солі - 0,25 мг.

Допоміжні речовини: натрію гідроокис, хлоркрезол, лимонна кислота, вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості

ATCvet QG02AD90

Клопростенол - синтетичний функціональний аналог простагландину F2-альфа, який в лютеальній фазі естрального циклу викликає лізис жовтого тіла, сприяє росту і розвитку фолікул та створює передумови для настання тічки й овуляції.

Застосування

Великій рогатій худобі:

- для прискорення інволюції матки;
- при затримці посліду;
- при «прихованій» охоті;
- при порушеннях циклічності статевого циклу та ановуляторному статевому циклі;
- для прискорення регресії персистентного жовтого тіла та лікування лютеїнової кісти;
- для лікування ендометритів;
- для переривання фізіологічного та патологічного перебігу вагітності;
- при несправжній вагітності.

Кобилам: для стимуляції еструсу і регресії персистентного жовтого тіла, при ембріональних викиднях, при лактаційному анеструсі, для переривання в першій половині фізіологічної й патологічної вагітності, при несправжній вагітності.

Вівцематкам: для синхронізації статевої охоти і лікування дисфункціональних станів яєчників

Свиноматкам: для стимуляції родів та синхронізації опоросів, профілактики післяродових захворювань.

Сукам, кішкам: в комплексній терапії хронічних ендометритів та для переривання небажаної вагітності

Дозування

Препарат вводять внутрішньом'язево

Велика рогата худоба

Для синхронізації охоти вводять 2 мл препарату (0,50 мг діючої речовини) 2 рази з інтервалом 10 днів. Першу дозу препарату вводять у будь-якій фазі статевого циклу (у корів в період 40-60 днів після розтелу). На 11-й день після першого введення вводять другу дозу, на 14-й день (72-76 годин після другої дози) проводять штучне осіменіння (не зважаючи на зовнішні ознаки тічки) з наступним повторним штучним осіменінням (15-й день). Перед кожним застосуванням препарату для синхронізації статевого циклу потрібно проводити дослідження статевих органів.

Передумовою для обробки тварин естрофаланом є фізіологічний стан їхніх статевих органів, у ялових корів їх статеві і фізіологічна зрілість.

При функціональних розладах яєчників вводять 2 мл препарату, штучне осіменіння проводять при появі ознак тічки. Якщо тічка не настала, препарат вводять повторно в дозі 2 мл на 11-й день після першого введення з наступним штучним осіменінням через 72-76 годин, по потребі проводять повторне штучне осіменіння. Для лікування фолікулярних кіст вводять одноразово 2 мл препарату, не раніше ніж на 10-й день після введення хоріонічного гормону при встановленні позитивної оваріальної відповіді.

При післяродових захворюваннях матки (післяродовий метрит, субінволюція матки) для зняття «прогестеронового блоку» та нормалізації естрадіол-прогестеронового співвідношення, що забезпечує дію на матку міотонічних препаратів, вводять 2 мл препарату, при потребі лікування можна доповнити внутрішньоматковою локальною санацією, на 11-й день - повторне введення, 14-й день - штучне осіменіння, 15-й день - повторне штучне осіменіння.

Для переривання фізіологічного перебігу вагітності вводять 2 мл препарату в період між 7 і 150 днями вагітності, причому до 100 днів препарат найбільш ефективний (подальший догляд залежно від клінічного стану).

Для переривання патологічної вагітності вводять 2 мл препарату в будь-якій стадії вагітності, після чого відбувається вигнання муміфікованого плода з матки в піхву та його подальшого видалення.

Свиноматки

Одноразова доза, що складає 0,5-0,7 мл препарату (0,175 мг діючої речовини), вводиться від 111 дня вагітності. Більша частина індукованих опоросів настає до 40 годин після введення з кульмінацією між 24-35 годинами.

Вівцематкам - 0,5-0,7 мл.

Для синхронізації статевої охоти в період парувальної кампанії самкам, які після першого введення не прийшли в статеву охоту, роблять повторну ін'єкцію в тій же дозі.

Неплідним вівцематкам в стані анафродизії при дисфункціях яєчників, препарат вводять одночасно з гонадотропіном СЖК в дозі 500 МО. Вівцям, які не прийшли в статеву охоту, препарат в тій же дозі через 10-11 днів вводять повторно. Охоту у овець виявляють баранами-пробниками двічі – зранку та ввечері з наступним їх осіменінням.

Кобили

Одноразова доза становить 1 мл препарату (0,25 мг діючої речовини). Кобилам із неповноцінним статевим циклом препарат вводять у період від 5 до 13 дня після тічки. Найбільш оптимальним часом для осіменіння є 4-6 день після введення препарату.

Суки - 0,2-0,3 мл.

Кішки – 0,1 мл, для викликання абортів необхідно 3-5 ін'єкцій з інтервалом 12 годин

Протипоказання

Не застосовувати самкам у першій третині вагітності (за винятком випадків цілеспрямованого переривання вагітності).

Застереження

Не вводити внутрішньовенно

Форма випуску

Скляні ампули по 1, 2, 5 мл та флакони по 10, 20, 50, 100, 200 мл.

Зберігання

Суше, темне місце при температурі від 5°C до 25°C.

Термін придатності – 2 роки.

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua