



ФАРМАТИЛ-50

(розчин для ін'єкцій)

листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин жовтуватого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

тилозину тартрат - 50 мг.

Допоміжні речовини: пропіленгліколь, спирт бензиловий, метилпарабен, пропілпарабен, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01-антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування, QJ01FA90 - Тилозин.

Тилозин - макролідний антибіотик, який пригнічує бактеріальний синтез протеїнів внаслідок зв'язування активної речовини з 50S субодинамиами рибосом. Препарат діє бактеріостатично на грампозитивні (*Actinomyces* spp., *Bacillus anthracis*, *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Streptococcus* spp.) і грамнегативні мікроорганізми (*Actinobacillus* spp., *Bordetella bronchiseptica*, *Fusobacterium* spp., *Haemophilus* spp., *Moraxella* spp., *Pasteurella* spp., *Proteus mirabilis*, *Salmonella* spp.), а також мікоплазми (*Mycoplasma gallisepticum*, *M. hyopneumoniae*, *M. synoviae*, *M. meleagridis*, *M. agalactiae*, *M. Bovigenitalium*).

При внутрішньом'язовому введенні антибіотик резорбується швидко і досягає максимальних концентрацій у тканинах організму приблизно через 1 годину після введення. Терапевтичний рівень антибіотика в тканинах зберігається протягом не менше 20 годин. Період напіввиведення препарату у дрібних жуйних тварин становить – 54 хвилини, у новонароджених телят – 139 хвилин і у телят 2-місячного віку і старше – 64 хвилини. Тилозин виводиться з організму переважно з сечею і молоком.

Застосування

Велика рогата худоба: лікування тварин, хворих на пневмонію, мастит, пневмоентерит, а також при інших захворюваннях, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тилозину.

Вівці, кози: лікування тварин, хворих на бронхопневмонію, інфекційну агалактію, а також при інших захворюваннях, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тилозину.

Свині: лікування тварин, хворих на ензоотичну пневмонію, мікоплазмозний артрит, дизентерію, а також при інших захворюваннях, атрофічний риніт, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тилозину.

Собаки, коти: лікування тварин при захворюваннях травного каналу та органів дихання, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тилозину.

Кролі (декоративні): лікування тварин при захворюваннях травного каналу та органів дихання, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тилозину.



Дозування

Внутрішньом'язово одноразово у дозі

Вид тварин	Доза препарату (мл препарату на 1 кг маси тіла тварин)	Доза препарату по діючій речовині (мг тилозину тартрату на 1 кг маси тіла тварини)
Велика рогата худоба, телята	0,1	5,0
Вівці, кози	0,12-0,24	6,0-12,0
Свині	0,2	10,0
Собаки, коти	0,05-0,2	2,5-10,0
Кролі (декоративні)	0,24-0,3	12,0-15,0

Курс лікування – 3-5 діб.

Протипоказання

Підвищена чутливість до тилозину.

Не застосовувати одночасно з пеніцилінами, цефалоспоринами і лінкоміцином.

Не застосовувати тваринам з порушенням функції печінки та нирок.

Препарат не застосовувати коням.

Не застосовувати тваринам в період вагітності. Не застосовувати при наявності резистентних штамів збудника до тилозину або при крос-резистентності до інших антибіотиків групи макролідів.

Застереження

Побічна дія

Можливі алергічні реакції у вигляді еритеми, пруритусу, діареї, набряку слизової оболонки. Також можливі помірні порушення з боку травного каналу у вигляді анорексії або діареї. У свиней можливе виникнення набряку слизової оболонки прямої кишки, який супроводжується свербіжом, еритемою та діареєю. При внутрішньом'язовому застосуванні можуть спостерігатись місцеві реакції, а саме, припухлість і болючість у місці введення.

Особливі застереження при використанні

Перед застосуванням препарату рекомендуємо провести тестування на чутливість мікроорганізмів-збудників до препарату.

У перший тиждень життя тваринам препарат не призначають. Не вводити в одне місце дорослій великій рогатій худобі більше як 20 мл, телятам, вівцям, козам – не більше як 10-15 мл, поросяткам, свиням – 5-10 мл. Якщо необхідна доза перевищує дозовану, її ділять і вводять в декілька місць.

Період виведення (коренції)

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 21 добу (велика рогата худоба), 14 діб (свині) та 8 діб (вівці, кози) після останнього застосування препарату. Споживання молока дозволяють через 4 доби після останнього введення препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо та молоко утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Флакони зі скла закриті гумовими корками під алюмінієву обкатку по 10, 50 мл.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 10 °С до 25 °С.

Термін придатності — 2 роки. Термін придатності після першого відбору 28 діб за умови зберігання в холодильнику за температури від 4 °С до 8 °С.

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1

www.ukrzoovet.com.ua

Виробники готового продукту

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1

www.ukrzoovet.com.ua

А
Для застосування
у ветеринарній медицині

ТОВ «ЕКОБІОЗАХИСТ»

11703, Житомирська обл.,

м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 100

Телефон: +380 414153502, Україна

