



ukrzoovet.com.ua

Реєстраційне посвідчення
№ АВ -01046-01-10

ФЕНЗОЛ 22 %

(порошок для перорального застосування)

листівка-вкладка

Опис

Порошок білого кольору або кольору барвника без запаху.

Склад

100 г препарату містить діючу речовину:

фенбендазол - 22 г;

допоміжні речовини: цукрова пудра, карбонатний наповнювач, натрію бензоат, сансет жовтий, крохмаль.

Фармакологічні властивості

АТСvet код QP52, антигельмінтні препарати, (QP52AC13, фенбендазол).

Діюча речовина - фенбендазол (група бензімідазолів) гальмує полімеризацію білків тубулінів у мікротубуліни, знижує активність енергетичних ферментів, що викликає загибель паразитів від виснаження. Фензол 22% практично нетоксичний для тварин, ембріотоксичні і тератогенні властивості не встановлені.

Викликає порушення метаболізму у гельмінтів, внаслідок чого обмежується засвоєння глюкози, знижуються мітохондріальні реакції, порушується мітоз клітин – настає повне виснаження паразитів, викликає параліч м'язів у цестод. Ефективний проти імагінальних та лярвальних стадій паразитів.

Володіє овоцидною дією. Ефективний проти шлунково-кишкових та легеневих нематод, у збільшеній дозі - проти трематод і цестод тварин.

Застосування

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, м'ясоїдних тварин, хутрових звірів, курей, гусей при гельмінтозах, викликаних шлунково-кишковими та легневими нематодами, трематодами та цестодами (*Ancylostoma*, *Ascaris*, *Bunostomum*, *Cooperia*, *Dictyocaulus*, *Haemonchus*, *Metastrongylus*, *Nematodirus*, *Ostertagia*, *Oesophagostomum*, *Oxyuris*, *Protostrongylus*, *Parascaris*, *Strongyloides*, *Stephanurus*, *Toxocara*, *Toxascaris*, *Trichuris*, *Trichostrongylus*, *Uncinaria*, статевозрілих трематод родини *Paramphistomatidae*, і деяких видів цестод *Moniezia expansa*, *M. benedeni*, *Thysaniezia giardi*, *Taenia spp.*).

Дозування

Препарат вводять перорально у дозах:

Вид тварин, птиці	Гельмінтози	Кратність вєдень	Доза фєнзолу 22
Велика рогата худоба	Диктіокаульоз, стронгілятоз, стронгілоїдоз	одноразово	0,45
	Дикроцєліоз	одноразово	1,6
	Цистицеркоз	три доби	1,15

Вівці, кози	Протостронгілоз, стронгілятози, стронгілодоз, дктіокаульоз, моніезіоз	одноразово	0,7
	Трихуроз	дві доби	0,7
	Лярвальні цестоدوزи	три доби	1,8
	Дикроцеліоз	дві доби	1,0
Свині	Аскароз	дві доби	0,7
	Езофагостомоз, стронгілодоз	одноразово	0,45
	Трихуроз	два рази на добу	1,5
Коні	Параскаридоз, оксіуроз	Одноразово	0,7
	Стронгілодоз	два рази на добу	1,5
М'ясоїдні тварини (собаки, коти, хутрові звірі)	Нематодозні інвазії	Одноразово	2,2
Кури	Аскаридоз, гетеракідоз	дві доби оспіль	0,45
Гуси	Амідостомоз, дрепанідотеніоз, гіменолепідоз	одноразово	1,8

Протипоказання

Підвищена чутливість до фенбендазолу.

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 10 діб, птиці - через 3 доби, молоко можна вживати в їжу - через 2 доби після дегельмінтизації. У випадку забою раніше встановленого терміну, м'ясо згодують м'ясоїдним тваринам або переробляють на м'ясо-кісткове борошно.

Форма випуску

Поліетиленові чи ламіновані пакети по 10, 150 г.

Зберігання

Зберігають препарат у сухому темному місці за температури від 15 до 30⁰С.

Термін придатності - 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,
Тел. 0800211201

Виробник готового продукту

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,
Тел. 0800211201
www.ukrzoovet.com.ua