



Фензол - 250 (таблетки)

листівка-вкладка

Опис

Таблетки білого або сіруватого кольору.

Склад

Таблетка (1 г) містить діючу речовину:
фенбендазол - 250 мг.

Допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, цукрова пудра, кросповідон, кальцію стеарат, аеросил.

Фармакологічні властивості

ATCvet код QP52AC - бензімідазоли і їх похідні, QP52AC12 - фенбендазол.

Діюча речовина - фенбендазол (група бензімідазолів) гальмує полімеризацію білків тубулінів у мікротубуліни, знижує активність енергетичних ферментів, уповільнює метаболізм у гельмінтів, внаслідок чого порушується засвоєння поживних речовини (аденозинтрифосфорної кислоти та глюкози), знижуються мітохондріальні реакції, настає повне виснаження і параліч паразитів.

Препарат Фензол–250 таблетки практично нетоксичний для тварин, ембріотоксичні і тератогенні властивості не встановлені.

Фенбендазол володіє овоцидною дією. Ефективний проти шлунково-кишкових та легених нематод, у збільшеній дозі - проти трематод і цестод тварин.

Застосування

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, м'ясоїдних тварин, хутрових звірів, курей, гусей при гельмінтозах, викликаних шлунково-кишковими та легеними нематодами, трематодами та цестодами (*Ancylostoma*, *Ascaris*, *Bunostomum*, *Cooperia*, *Dictyoacaulus*, *Haemonchus*, *Metastrongylus*, *Nematodirus*, *Ostertagia*, *Oesophagastomum*, *Oxyuris*, *Protostrongylus*, *Parascaris*, *Strongyloides*, *Stephanurus*, *Toxocara*, *Toxascaris*, *Trichuris*, *Trichostrongylus*, *Uncinaria*, статевозрілими трематодами *Dicrocoelium lanceatum* і деякими видами цестод *Moniezia expansa*, *M. benedeni*, *Thysaniezia giardi*, *Taenia* spp.).

Дозування

Внутрішньо безпосередньо або у подрібненому вигляді в суміші з кормом, у дозі, г (таблеток) на 10 кг маси тіла:



Вид тварин, птиці	Гельмінтози	Кратність введення	Доза Фензол-250 (таблетки), табл. /10 кг маси тіла
Велика рогата худоба	Диктіокаульози, стронгілятози, стронгілоїдоз	Одноразово	0,4
	Дикроцеліози	Одноразово	1,5
	Цистицеркози	Три доби поспіль	1
Вівці, кози	Протостронгілози, стронгілятози, стронгілози, диктіокаульоз, монієзійоз	Одноразово	0,5
	Трихуроз	Дві доби поспіль	0,5
	Дикроцеліоз	Дві доби поспіль	1
Свині	Аскароз	Два рази на добу	0,5
	Езофагостомоз, стронгілоїдоз	Одноразово	0,4
	Трихуроз	Два рази на добу	1,2
Коні	Параскароз, оксіуроз	Одноразово	0,5
	Стронгілоїдоз	Два рази на добу	1,2
М'ясоїдні тварини (собаки, коти, хутрові звірі)	Нематодози	Одноразово	2,0
Кури	Аскаридіоз, гетеракідоз	Дві доби поспіль	0,4
Гуси	Амідостомоз, дрепанідотеніоз, Гіменолепідіози	Одноразово	1,5

Протипоказання

Підвищена чутливість до фенбендазолу.

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 14 діб після останнього застосування препарату, молоко в їжу людям використовують через 4 доби. До вказаного терміну молоко та м'ясо згодують непродуктивним тваринам або утилізують.

Форма випуску

Поліетиленові або поліпропіленові банки по 100 таблеток, блістери по 12 таблеток, 2 блістери пакуються у картонну коробку.

Зберігання

В упакованні виробника за температури від 2 °С до 30 °С та відносній вологості не більше 75%. Термін придатності - 2 роки.

Власник РП та виробник

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»
вул. Васильківська, 16, м. Київ, 03040, Україна

Для застосування
у ветеринарній медицині

