

**ФЕНЗОЛ - 250 (ТАБЛЕТКИ)**

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

Описание

Таблетки белого или сероватого цвета.

Состав

Таблетка (1 г) содержит действующее вещество:

фенбендазол - 250 мг.

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, сахарная пудра, кросповидон, кальция стеарат, аэросил.

Фармакологические свойства

АТСvet QP52, антигельминтные ветеринарные препараты, (QP52AC13, фенбендазол).

Действующее вещество - фенбендазол (группа бензимидазолов) тормозит полимеризацию белков тубулинов в микротубулины, снижает активность энергетических ферментов, замедляет метаболизм у гельминтов, в результате чего нарушается усвоение питательных веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюкозы), снижаются митохондриальные реакции, наступает полное истощение и паралич паразитов.

Препарат Фензол - 250 (таблетки) практически нетоксичен для животных, эмбриотоксические и тератогенные свойства не установлены.

Фенбендазол обладает овоцидным действием. Эффективен против желудочно-кишечных и легочных нематод, в увеличенной дозе - против трематод и цестод животных.

Применение

Дегельминтизация крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, плотоядных животных, пушных зверей, кур, гусей при гельминтозах, вызванных желудочно-кишечными и легочными нематодами, трематодами и цестодами (*Ancylostoma, Ascaris, Bunostomum, Cooperia, Dictyocaulus, Haemonchus, Metastrongylus, Nematodirus, Ostertagia, Oesophagostomum, Oxyuris, Protostrongylus, Parascaris, Strongyloides, Stephanurus, Toxocara, Toxascaris, Trichuris, Trichostrongylus, Uncinaria, половозрелых трематод Dicrocoelium lanceatum*, и некоторыми видами цестод *Moniezia expansa, M. benedeni, Thysaniezia giardi, Taenia spp.*).

Дозировка

Внутри непосредственно или в измельченном виде в смеси с кормом в дозе, г (таблеток) на 10 кг массы тела:

Вид животных, птицы	Гельминтозы	Кратность введения	Доза Фензол-250 табл. (г)/10 кг массы тела
Крупный рогатый скот	Диктиокаулёзы, стронгилятозы, стронгилоидоз	одноразово	0,4
	Дикроцелиозы	одноразово	1,5
	Цистицеркозы	трое суток подряд	1
Овцы, козы	Протостронгилидозы, стронгилятозы, стронгилидозы, диктиокаульоз, мониезиоз	одноразово	0,5
	Трихуроз	двое суток подряд	0,5
	Дикроцелиоз	двое суток подряд	1
Свиньи	Аскароз	два раза в сутки	0,5
	Эзофагостомоз, стронгилоидоз	одноразово	0,4

	Трихуроз	два раза в сутки	1,2
Кони	Параскарроз, оксиуроз	Одноразово	0,5
	Стронгилоидоз	два раза в сутки	1,2
Плотоядные животные (собаки, кошки, пушные звери)	Нематодозы	Одноразово	2,0
Куры	Аскаридиоз, гетеракидоз	двое суток подряд	0,4
Гуси	Амидостомоз, дрепанидотениоз, Гименолепидидозы	Одноразово	1,5

Противопоказания

Повышенная чувствительность к фенбендазолу.

Предостережение

Убой животных на мясо разрешается через 14 суток после последнего применения препарата, молоко в пищу людям используют через 4 суток. До указанного срока молоко и мясо скармливают непродуктивным животным или утилизируют.

Форма выпуска

Таблетки упакованы в картонные коробки по 24 шт., банки из полимерных материалов по 100 шт.

Хранение

В упаковке производителя при температуре от 2 до 30 °С и относительной влажности не более 75%.

Срок годности - 2 года.

Владелец регистрационного удостоверения:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпочтач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua

Производитель готового продукта:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпочтач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua