

Флай Стоп
розчин для зовнішнього застосування
листівка-вкладка

Опис

Прозора рідина світло-жовтого кольору зі специфічним запахом.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину
бетацифлутрин - 10 мг.

Допоміжні речовини: рицинова олія, етилацетат.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP53, ектопаразитоциди, інсектициди и репеленти , QP53AC12 – цифлутрин.

Флай Стоп володіє контактною інсекто-акарицидною та репелентною дією відносно двокрилих комах: зоофільних мух (*Haematobia irritans*, *Haematobosca stimulans*, *Musca autumnalis*, *Stomoxys calcitrans*), гедзів (родина *Tabanidae*), оводів (родини *Hypodermatidae*, *Gasterophilidae*), кровососок (родина *Hippoboscidae*), комарів (родина *Culicidae*), мошок (родина *Simuliidae*), а також москітів, бліх, вошей, волосоїдів та іксодових кліщів.

Бетацифлутрин, що входить до складу препарату, належить до групи синтетичних піретроїдів. Механізм дії його полягає в блокуванні передачі нервових імпульсів, що призводить до порушення координації рухів, паралічу і загибелі комах і кліщів. Після нанесення на шкіру препарат розподіляється по поверхні тіла, в незначній мірі всмоктується шкірою, що забезпечує його тривалу інсекто-акарицидну і репелентну дію.

Флай Стоп за ступенем впливу на організм відноситься до малонебезпечних речовин і в рекомендованих дозах не чинить резорбтивно-токсичної, ембріотоксичної, тератогенної, мутагенної, імунотоксичної і місцевопоздразнюючої дії на шкіру. При попаданні в очі викликає слабе подразнення. Препарат токсичний для риб, гідробіонтів і бджіл.

Застосування

Флай Стоп застосовують для обробки великої рогатої худоби, коней, овець та кіз в пасовищний період з метою знищення зоофільних мух, гедзів, оводів, комарів, мошок, бліх, кліщів і захисту тварин від їх нападу.

Дозування

Флай Стоп застосовують великій рогатій худобі та коням шляхом нанесення препарату на шкіру спини вздовж хребта від холки до крижів з розрахунку 10 мл на дорослу тварину.

Кози та вівці обробляються шляхом нанесення препарату на шкіру спини вздовж хребта від холки до крижів з розрахунку 0,2 мл на 10 кг маси тіла. Вівці доречно обробляти після стрижки.

Обробку великої рогатої худоби, овець та кіз проводять в пасовищний період один раз на 3-4 тижні в залежності від чисельності комах. Дійних корів слід обробляти одразу після вечірнього доїння. Коней обробляють в період активності комах і кліщів. Захисна дія Флайстоп триває не менше 28 днів після одноразової обробки. У разі пропуску чергової обробки, застосування препарату відновлюють у тій же дозі і за тією ж схемою.

Перед обробкою за допомогою каністри з дозуючим пристроєм, необхідно наповнити дозатор. Для переведення дозуючого пристрою каністри у робоче положення, слід щільно закрутити кришку на горлі каністри та відкрутити кришку з дозуючого пристрою. Набрати препарат в дозатор шляхом легкого натискання на бічні стінки каністри під візуальним контролем до поділки 10 мл та нанести препарат на шкірний покрив тварини.

Побічна дія

У гіперчутливих тварин можливі алергічні реакції. У деяких випадках у тварини при першому застосуванні препарату можливе збільшення слиновиділення, яке самостійно проходить без

застосування лікарських засобів. При передозуванні у тварин може бути пригнічений стан і підвищена слинотеча.

Протипоказання

Препарат не слід наносити на вологу, пошкоджену або забруднену шкіру, не застосовувати одночасно з іншими інсектоакарицидами.

Застереження

При застосуванні препарату продукцію від тварин використовують без обмежень. При проведенні маніпуляцій з препаратом заборонено курити, пити і приймати їжу. Обробку тварин слід проводити з використанням спецодягу (халат, головний убір, гумові чоботи, гігієнічні рукавички). Після закінчення роботи слід ретельно вимити руки теплою водою з милом. При випадковому потрапленні препарату на шкіру або слизові оболонки очей їх необхідно промити великою кількістю проточної води. Людям, що страждають на алергію, слід уникати прямого контакту з препаратом. У разі появи алергічних реакцій або при випадковому попаданні препарату в організм людини слід негайно звернутися в медичний заклад, маючи при собі інструкцію із застосування препарату або етикетку.

Забороняється використання тари з-під засобу для побутових цілей.

Форма випуску

Препарат розфасовують в полімерну або скляну тару по 10, 50, 100 мл і полімерні каністри по 500 і 1000 мл.

Зберігання

У сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів і кормів у закритій упаковці при температурі від 8 до 25°C.

Термін придатності - 2 роки. Термін придатності після першого відкриття – 60 діб.

Виробник готового продукту:

ПрАТ «ВНП» Укрзооветпромстач »
Україна, 03040, Київ, вул. Васильківська, 16
Тел. +380442574114, 2576311.
E-mail: zoovet@ukrzoovet.com.ua
www.ukrzoovet.com.ua