



КЛОЗАВЕРМ-А

(розчин для ін'єкцій)

листівка-вкладка

Опис

Маслянистий однорідний прозорий розчин жовтого кольору зі специфічним запахом.

Склад

100 г препарату містять діючі речовини:

аверсектин С - 0,2 г;

клозантел - 5,0 г.

Допоміжні речовини: метилпарабен, пропілпарабен, полівінілпіразолідон, поліетиленгліколь, спирт етиловий, спирт бензиловий, вода дистильована.

Фармакологічні властивості

АТСvet QP52A, протитрематодні, протинематодні і протицестодні ветеринарні препарати

Клозаверм-А має широкий спектр протипаразитарної дії, згубно діє на трематоди, нематоди, личинок оводів, збудників сифункулятозів і саркоптозів. Компоненти препарату виявляють синергічну дію. Аверсектин С посилює вироблення нейромедіатора – гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), порушуючи передачу нервових імпульсів. Клозантел, пригнічуючи активність ферментів, порушує метаболічні процеси у паразитів, що призводить до паралічу і їх загибелі. Препарат помірно токсичний для теплокровних тварин, у рекомендованих дозах не виявляє мутагенної, сенсibiliзуючої, ембріотоксичної і тератогенної дії. Токсичний для риби і бджіл. Препарат виводиться з організму із сечею та жовчю, у лактуючих тварин з молоком.

Клозаверм-А виявляє виражену активність проти трематод (*Fasciola hepatica* (у т.ч. личинок старше 6 тижнів), *Dicrocoelium lanceatum*); шлунково-кишкових і легеневих нематод (*Bunostomum trigonocephalum*, *Bunostomum phlebotomum*, *Haemonchus contortus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Oesophagostomum columbianum*, *Dictyocaulus filaria*, *Dictyocaulus viviparus*, *Ostertagia circumcincta*, *Ostertagia ostertagi*, *Nematodirus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Chabertia ovis*); личинок підшкірних оводів (*Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*, *Oestrus ovis*); при ураженні вошами (сифункулятозах спричинених *Haematopinus eurysternus*) у великої рогатої худоби; проти саркаптоїдних та псороптоїдних кліщів (*Psoroptes bovis*, *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes bovis*, *Sarcoptes ovis*, *Sarcoptes caprae*) у великої рогатої худоби, овець та кіз.

Застосування

Профілактика та лікування великої рогатої худоби, овець, кіз при ураженнях трематодами, шлунково-кишковими і легеневиими нематодами, личинками підшкірних оводів, вошами, кліщами:

велика рогата худоба: фасціольоз (*Fasciola* spp.) шлунково-кишкові стронгілятози (*Haemonchus contortus*, *Nematodirus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Oesophagostomum radiatum*, *Bunostomum* spp., *Ostertagia* spp.), гіподерматоз (личинки *Hypoderma bovis*); сифункулятоз (*Haematopinus eurysternus*), саркоптоз та псороптоз (*Psoroptes bovis*, *Sarcoptes bovis*);

вівці, кози: фасціольоз (*Fasciola hepatica* і *Fasciola gigantica*), шлунково-кишкові стронгілятози (*Haemonchus contortus*, *Nematodirus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Oesophagostomum* spp., *Bunostomum* spp., *Chabertia ovis*, *Ostertagia* spp.), естро́з (личинки *Oestrus ovis*), саркоптоз та псороптоз (*Psoroptes ovis*, *Sarcoptes ovis*, *Sarcoptes caprae*).



Дозування

Препарат вводиться вівцям та козам підшкірно, великій рогатій худобі – внутрішньом'язово із дотриманням правил асептики.

Доза препарату становить: 0,5 мл/10 кг маси тіла тварини; кратність введення: одноразово при гельмінтозах і ентомозах; дворазово при саркоптозах з інтервалом 7-10 днів.

Дегельмінтизацію тварин проводять перед переходом на зимове стійлове утримання та весною перед вигоном на пасовища. Проти підшкірного овода після закінчення льоту оводів, проти саркопозів та сифункулятозів – за показами.

Перед обробкою великого поголів'я тварин кожен партію препарату попередньо випробовують на невеликій групі тварин (7-10 голів). За відсутності ускладнень впродовж 3 днів обробляють усе поголів'я тварин.

Протипоказання

Підвищена чутливість до складових препарату.

Не застосовувати хворим, ослабленим та виснаженим тваринам.

Не застосовувати самкам у останній місяць вагітності.

Застереження

На місці введення препарату можливе виникнення місцевої реакції (набряк, гіперемія), яка швидко самостійно проходить і не вимагає застосування терапевтичних засобів.

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 28 днів після останнього застосування препарату, молоко можна вживати в їжу – через 14 днів. При вимушеному забої м'ясо використовують для годівлі м'ясоїдних тварин залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Скляні флакони по 10, 20, 50, 100, 150, 200, 400, 500 мл.

Зберігання

Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей, місці за температури від 5 до 25 °С. Список Б.

Термін придатності - 2 роки.

**Власник реєстраційного посвідчення
та виробник готового продукту**

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпочах»

Україна, 03040, м. Київ,

вул. Васильківська, 16,

0 800 211 201

www.ukrzoovet.com.ua

Для застосування
у ветеринарній медицині

А

