



ukrzoovet.com.ua

Реєстраційне посвідчення
№ АВ -00902-01-10

ЛЕВАМІЗОЛ – 7,5 %
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Прозора, безбарвна рідина зі специфічним запахом.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

левамізолу гідро хлорид - 0,075 г (у перерахунку на діючу речовину).

Допоміжні речовини: натрію цитрат, лідокаїн, трилон Б, пропіленгліколь, натрію метабісульфіт, метилпарабен, пропілпарабен, вода апірогенна.

Фармакологічні властивості

АТСvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати, (АТСvet QP52AE01, левамизол).

Левамізол - синтетична сполука із групи тетраїмідазолів, антгельмінтик, широкого спектру нематоцидної дії, активний по відношенню до личинкових і статевозрілих фаз розвитку нематод шлунково-кишкового тракту й легенів.

Механізм дії препарату полягає у впливі на нервово-м'язову систему, блокуванні фумаратредуктази та пригніченні утворення АТФ у паразита, що призводить до його паралічу і загибелі.

Препарат належить до помірно токсичних речовин для теплокровних тварин (III клас безпечності), у терапевтичній дозі не має місцево-подразнюючої, ембріотоксичної, тератогенної, мутагенної і сенсibiliзуючої дії.

Застосування

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, собак при ураженні шлунково-кишковими та легеневими нематодами:

велика рогата худоба - *Ostertagia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Bunostomum spp.*, *Nematodirus spp.*, *Cooperia spp.*, *Trichuris spp.*, *Dictyocaulus viviparus*;

вівці, кози - *Ostertagia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Bunostomum spp.*, *Nematodirus spp.*, *Cooperia spp.*, *Strongyloides spp.*, *Trichuris*, *Dictyocaulus filaria*, *Chabertia ovina*, *Protostrongylus spp.*;

свині - *Ascaris suum*, *Hyostrongylus spp.*, *Metastrongylus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Trichuris suis*;

собаки - *Toxocara canis*, *Toxoascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*.

Дозування

Рекомендована доза препарату Левамизол – 7,5 % становить 1,0 мл препарату /10 кг маси тіла тварини (за діючою речовиною - 7,5 мг/кг маси тіла тварини).

Препарат вводять без попередньої голодної дієти і послаблюючих засобів, одноразово, підшкірно (великій рогатій худобі, вівцям та козам можна внутрішньом'язово).

Максимальна доза препарату, що вводиться одній тварині, не повинна перевищувати:
великій рогатій худобі - 30 мл; *свиням* - 20 мл; *вівцям і козам* - 4,5 мл.

Максимальна доза препарату для введення в одне місце не повинна перевищувати: *великій рогатій худобі* - 20 мл, *свиням* - 10 мл, *вівцям і козам* - 5 мл, *собакам* - 2,5 мл.

Протипоказання

Не обробляти ослаблених та хворих тварин.

Не можна застосовувати препарат коням.

Не застосовувати препарат собакам до однорічного віку, і собакам великих порід до 18-місячного віку.

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 7 діб, вживання молока в їжу людям - через добу після останнього введення препарату. У випадку забою раніше встановленого терміну м'ясо використовують для годівлі м'ясоїдних тварин або виготовлення м'ясо-кісткового борошна, молоко випоюють непродуктивним тваринам.

Форма випуску

Ампули по 2 мл, скляні флакони по 10, 50, 100мл.

Зберігання

У приміщеннях, захищених від прямого сонячного світла при температурі від 5 до 25 °С.

Термін придатності - 2 роки при дотриманні умов зберігання.

Власник реєстраційного посвідчення

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,

Тел. 0800211201

Виробник готового продукту

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua