



# ЛЕВАМІЗОЛ – 7,5 %

(розчин для ін'єкцій)

листівка-вкладка

## Опис

Прозора, безбарвна рідина зі специфічним запахом.

## Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

левамізолу гідрохлорид - 0,075 г (у перерахунку на діючу речовину).

Допоміжні речовини: натрію цитрат, лідокаїн, трилон Б, пропіленгліколь, натрію метабісульфіт, метилпарабен, пропілпарабен, вода апірогенна.

## Фармакологічні властивості

**ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати, (ATCvet QP52AE01, левамізол).**

Левамізол - синтетична сполука із групи тетраїмідазолів, антигельмінтик, широкого спектру нематодцидної дії, активний щодо до личинкових і статевозрілих фаз розвитку нематод шлунково-кишкового тракту й легенів.

Механізм дії препарату полягає у впливі на нервово-м'язову систему, блокуванні фумаратредуктази та пригніченні утворення АТФ у паразита, що призводить до його паралічу і загибелі.

Препарат належить до помірно токсичних речовин для теплокровних тварин (III клас безпечності), у терапевтичній дозі не має місцево-подразнюючої, ембріотоксичної, тератогенної, мутагенної і сенсibilізуючої дії.

## Застосування

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, собак при ураженні шлунково-кишковими та легеневими нематодами:

**велика рогата худоба** - Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Trichuris spp., Dictyocaulus viviparus;

**вівці, кози** - Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Strongyloides spp., Trichuris, Dictyocaulus filaria, Chabertia ovina, Protostrongylus spp.;

**свині** - Ascaris suum, Hyostrongylus spp., Metastrongylus spp., Oesophagostomum spp., Trichuris suis;

**собаки** - Toxocara canis, Toxoascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala.



## Дозування

Рекомендована доза препарату ЛЕВАМІЗОЛ–7,5 % становить 1,0 мл препарату /10 кг маси тіла тварини (за діючою речовиною - 7,5 мг/кг маси тіла тварини).

Препарат вводять без попередньої голодної дієти і послаблюючих засобів, одноразово, підшкірно (великій рогатій худобі, вівцям та козам можна внутрішньом'язово). Максимальна доза препарату, що вводиться одній тварині, не повинна перевищувати:

**великій рогатій худобі** - 30 мл; **свиням** - 20 мл; **вівцям і козам** - 4,5 мл.

Максимальна доза препарату для введення в одне місце не повинна перевищувати: **великій рогатій худобі** - 20 мл, **свиням** - 10 мл, **вівцям і козам** - 5 мл, **собакам** - 2,5 мл.

## Протипоказання

Не обробляти ослаблених та хворих тварин!

Не можна застосовувати препарат коням!

Не застосовувати препарат собакам до однорічного віку, собакам великих порід до 18-місячного віку!

## Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 7 діб, вживання молока в їжу людям - через добу після останнього введення препарату. У випадку забою раніше встановленого терміну м'ясо використовують для годівлі м'ясоїдних тварин або виготовлення м'ясо-кісткового борошна, молоко випоюють непродуктивним тваринам.

## Форма випуску

Ампули по 2 мл, скляні флакони по 10, 20, 25, 50, 100, 200 мл.

## Зберігання

У приміщеннях, захищених від прямого сонячного світла за температури від 5 °С до 25 °С.

Термін придатності - 2 роки.

## Власник РП та виробник готового продукту

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»

Україна, 03040, м. Київ,

вул. Васильківська, 16

0 800 211 201

[www.ukrzoovet.com.ua](http://www.ukrzoovet.com.ua)

Для застосування  
у ветеринарній медицині

**А**

