



## МАЗЬ НОВЕРТИНОВА

листівка–вкладка

### Опис

Однорідна маса консистенції густої сметани від білого до світло-жовтого або світло-сірого кольору із слабким специфічним запахом.

### Склад

100 г препарату містить діючу речовину:

аверсектин С -0,05 г.

Допоміжні речовини: поліетиленгліколь-1500 (поліетиленоксид-1500), поліетиленгліколь-400 (поліетиленоксид-400), спирт етиловий, гліцерин.

### Фармакологічні властивості

#### *АТСvet QP54, ендектоциди (QP54AA авермектини)*

Аверсектин С є продуктом мікробного синтезу з використанням культури *Streptomyces avermitilis*, має протипаразитарні властивості. Препарат в організмі паразита посилює утворення нейромедіатора гама-аміномасляної кислоти (ГАМК), яка зв'язується з спеціальними рецепторами нервових закінчень, блокуючи нервові імпульси, що викликає параліч і загибель паразита. Препарат малотоксичний для ссавців.

### Застосування

Лікування собак, котів, хутрових звірів та кролів при ураженні арахно-ентомозами: псороптоз (*Psoroptes cuniculi*), отодектоз (*Otodectes cynotis*), нотоедроз (*Notoedres cati*, *N. cuniculi*), саркоптоз (*Sarcoptes canis*, *Sarcoptes cuniculi*), демодекоз (*Demodex canis* *D. Cati*), ураженні волосоїдами (*Trichodectes canis* *Felicola subrostratus*), вошами (*Linognathus setosus*, *Haemodipsus ventricosus*), блохами (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalus felis*, *Spilopsyllus cuniculi*).

### Дозування

При лікуванні псороптозу, отодектозу, нотоедрозу, саркоптозу, препарат наносять на уражені ділянки з розрахунку 0,2 г/см<sup>2</sup>. Обробку проводять двічі з інтервалом 5-7 діб, за необхідності лікування повторюють.

При демодекозі уражені ділянки обробляють препаратом з розрахунку 0,2 г/см<sup>2</sup>. Обробку повторюють п'ять разів з інтервалом 7-10 діб.

Для боротьби з блохами, вошами і волосоїдами мазь втирають проти шерсті в місця, недоступні для злизування. Обробку проводять двічі з інтервалом в 7-10 діб.

### Протипоказання

Не застосовувати для ослаблених, виснажених та хворих тварин!

### Застереження

Забій кролів на м'ясо дозволяють через 5 діб після останньої обробки. При забої до зазначеного терміну м'ясо використовують для годівля м'ясоїдних тварин.

### Форма випуску

Туби ламіновані по 30 г.

## **Зберігання**

Сухе, захищене від світла місце, при температурі від мінус 20 °С до 30 °С в упаковці підприємства-виробника, у закритих складських приміщеннях. Упаковки з препаратом зберігають на стелажах або піддонах.

Препарат у груповій (транспортній тарі) штабелюють. Висота штабеля – 2-3 яруси.

**Термін придатності - 2 роки.**

### **Власник реєстраційного посвідчення**

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,

Тел. 0800211201

### **Виробник готового продукту**

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,

Тел. 0800211201

[www.ukrzoovet.com.ua](http://www.ukrzoovet.com.ua)