



МЕТРОНІЗОЛ-К

(порошок для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Порошок білого або кремового кольору.

Склад

100 г препарату містить діючу речовину:

метронідазол - 25 г.

Допоміжні речовини: лактоза, крохмаль кукурудзяний.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01- антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування.QJ01XD01 - Метронідазол.

Метронідазол - синтетичний протибактеріальний та протипротозойний засіб, похідний 5-нітроімідазолу. Виявляє бактерицидну дію до тих мікрорганізмів, ферментні системи яких здатні відновлювати нітрогрупи. Метронідазол порушує реплікацію ДНК та синтез білку в мікробній клітині, інгібуючи тканинне дихання, легко проникає в клітини чутливих мікроорганізмів.

Ефективний проти *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Giardia intestinalis*, *Entamoeba histolytica*, *Balantidium coli*, *Lamblia spp.*, а також облигатних анаеробів *Bacteroides spp.*, *Helicobacter pylori*, *Fusobacterium spp.*, *Veillonella spp.*, *Eubacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Peptococcus spp.*, *Peptostreptococcus spp.*

Метронідазол розподіляється в тканинах і біологічних рідинах організму, таких як жовч, слина, плевральна, перитонеальна та спинномозкова рідини (приблизно 43% у плазмі крові), піхвовий секрет, кісткова тканина, печінка, еритроцити. Зв'язування з білками плазми становить менше 20%. Метронідазол проникає через плацентарний бар'єр, виділяється з молоком. В організмі метаболізується майже 30-60% метронідазолу шляхом гідроксилювання, окиснення і глюкурування. Основний метаболіт (2-оксиметронідазол) має протипротозойну та антибактеріальну дію. Метронідазол виводиться у незміненому вигляді та у вигляді метаболітів переважно з сечею (60-80%), частково з жовчю.



Застосування

Лікування котів, собак, норок, хворих на діарею, лямбліоз, амєбіоз, геардіоз, трихомоноз, анаеробні інфекції, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до метронідазолу.

Дозування

Перорально у дозі 40 мг препарату (10 мг діючої речовини) на 1 кг маси тіла тварини два рази на добу. Курс лікування - 10-20 діб.

Протипоказання

Не застосовувати продуктивним тваринам та птиці.
Підвищена чутливість до метронідазолу. Не застосовувати тваринам з ураженням центральної нервової системи та у першу третину вагітності, період лактації.
Не застосовувати цуценят та кошенят.

Застереження

Можливі побічні ефекти з боку травної системи: нудота, блювота, відсутність апетиту, запор і діарея. З боку ЦНС і периферичної нервової системи: підвищена збудливість, порушення сну, депресія, периферична невропатія, судоми, втрата слуху, дезорієнтація, непритомності. З боку системи кровотворення: транзиторна лейкопенія і тромбоцитопенія. Алергічні реакції: шкірне висипання, сверблячка, кропивниця.

Форма випуску

Поліетиленові банки або поліетиленові чи ламіновані пакети по 10, 100 г.

Зберігання

Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 0°C до 20°C і відносній вологості повітря не більше 75%.
Термін придатності - 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»
Україна, 03040, м. Київ,
вул. Васильківська, 16
0 800 211 201
www.ukrzoovet.com.ua

А
Для застосування
у ветеринарній медицині

