



МОЛОЧНА КИСЛОТА

розчин для перорального застосування

(рідкий премікс)

Інструкція по застосуванню

Опис

Рідина прозора, або злегка опалесцентна безбарвна чи з жовтуватим відтінком.

Склад

100 мл преміксу містить:

кислоту молочну – 40 г;

воду питну або дистильовану – до 100 мл.

Властивості.

В організмі тварини молочна кислота є природним метаболітом: вона утворюється під час анаеробного розщеплення вуглеводів – основного джерела енергії для м'язів і мозку. Є природним консервантом і регулятором кислотності: знижує рН корму та води; пригнічує ріст і розвиток умовно патогенної та гнильної мікрофлори шлунково-кишкового тракту (*Salmonella*, *Escherichia coli*), чим зумовлює зниження утворення токсичних продуктів розпаду органічних речовин в організмі.

Має протибродильні властивості, сприяє розслабленню шлункових та кишкових сфінктерів, полегшуючи евакуацію хімусу. Стимулює секрецію шлункового соку та покращує перетравлення білків і мінералів. Сприяє розвитку корисних бактерій (лакто- і біфідофлора) та зменшує ризик діареї, особливо у молодняку.

Призначення

Рекомендується для застосування коням, великій рогатій худобі, вівцям, козам, свиням, кролям та птиці в якості підкислювача води та корму з метою:

- запобігання діареї та шлунково-кишкових розладів, стабілізації мікрофлори кишечника;
- прискорення обміну речовин, що покращує загальний стан і підвищує апетит;
- гальмування бродильних процесів у шлунку та кишечнику, попередження здуття живота;
- ефективного засвоєння мінералів, що сприяє поліпшенню стану кісток, м'язів, суглобів і серцево-судинної системи;
- покращення конверсії корму.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість, ацидоз, гастрити з підвищеною кислотністю; гостра ниркова недостатність, схильність до колік у коней.



Спосіб введення та дозування

Вид тварин	Введення в воду (мл/л)	Введення в корм (мл/кг)
Кони	1–2	2–6 (починати з 1–2 мл, вводити поступово, протягом 5–7 днів адаптації)
Телята	2–4 (в молоко/ замінник молока)	–
Велика рогата худоба	–	6–14
Вівці та кози	–	6–10
Поросята після відлучення	2–6	16–30
Поросята на відгодівлі	–	5–10
Кролі	2–4 (для молодняка з 1,5-місячного віку починати з 1–2 мл)	4–10
Птиця бройлери	2–4	10–20
Птиця несучки	–	6–16

Необхідно починати введення молочної кислоти в воду або корм з менших доз. Вводити поступово (3–5 днів), контролювати поїдання корму, стан шлунково-кишкового тракту
Для рівномірного внесення в корм краще додавати у вигляді попередньо розбавленого з водою розчину (1:3–1:5) або через форсунки.

Попередження

У високих дозах може знижувати поїдання корму.
Потрібно контролювати корозійність обладнання.
Не змішувати безпосередньо з лужними розчинами.
Важливо рівномірне внесення.
Під час роботи з кислотою молочною необхідно користуватися захисними одягом і рукавичками, за необхідності – респіратором.

Форма випуску

Флакони зі скла або полімерного матеріалу по 100 мл та 500 мл.

Зберігання

У сухому, темному та недоступному для дітей місці за температури від 5 до 25 °С.
Термін придатності – 2 роки.

Виробник:

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»,
вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка, Бучанський р-н.,
Київська обл., 08030, Україна.
www.ukrzoovet.com.ua

