

ОКСИКЛОЗАНІД-600

(таблетки)

листівка-вкладка

Опис

Плоскоциліндричні таблетки від кремового до сірого кольору з фаскою та рискою.

Склад

1 г препарату (1 таблетка) містить діючі речовини: оксиклозанід - 600 мг, абамектин - 6 мг.
Допоміжні речовини: лактози моногідрат, мікроцелюлоза, крохмаль кукурудзяний, полівінілпіролідон K-25, кальцію стеарат, аеросил, вода очищена.

Фармакологічні властивості

ATC vet код QP52 - антигельмінтики, QP52AG06 - оксиклозанід.

Спектр антигельмінтної дії препарату ОКСИКЛОЗАНІД-600 таблетки ґрунтується на сукупній фармакологічній дії складових препарату - оксиклозаніда і абамектина.

Препарат ОКСИКЛОЗАНІД-600 таблетки має виражену трематодоцидну та нематодоцидну дію, згубно діє на всі фази розвитку *Fasciola spp.*, *Paramphistomum spp.* і *Dicrocoelium lanceatum.*, а також нематод травного каналу, включаючи види: *Bunostomum spp.*, *Chabertia spp.*, *Cooperia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Ostertagia spp.*, *Strongyloides spp.*, *Trichostrongylus spp.* і цестод – *Moniezia expansa*, *M.denedeni*, *M.autumnalia*.

Механізм дії оксиклозаніду полягає в порушенні процесів фосфорилування у гельмінтів, зниженні активності фумаратредуктази і сукцинат дегідрогенази, що призводить до паралічу і загибелі трематод.

Абамектин (авермектин B1), що входить до складу препарату, згубно діє на личинок і статевозрілі фази розвитку нематод травного каналу. Механізм його дії полягає у впливі на величину потоку іонів хлору через мембрани нервових і м'язових клітин паразитів. Основною мішенню є глутаматчутливі хлорні канали, а також рецептори гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК). Зміна току іонів хлору порушує проведення нервових імпульсів, що призводить до паралічу і загибелі паразитів.

При пероральному введенні препарату Оксиклозанід-600 таблетки швидко всмоктуються в травному каналі і проникає в органи і тканини; з організму виділяється в основному з сечею і фекаліями.

Препарат за ступенем впливу на організм відноситься до малонебезпечних речовин (4 клас небезпеки за ГОСТ 12.1.007-76), у рекомендованих дозах не володіє ембріотоксичними, тератогенними, мутагенними і алергенними властивостями.

Застосування

Препарат призначають для дегельмінтизації великої рогатої худоби, овець і кіз при гострому та хронічному фасцієліозі, дикроцеліозі, парамфістоматидозах, нематодозах та монієзіозі.



Дозування і спосіб введення

З лікувальною та профілактичною метою препарат застосовують одноразово в суміші з кормом великій рогатій худобі індивідуально, дрібній рогатій худобі індивідуально або груповим способом, в таких дозах:

— Велика рогата худоба при парамфістоматидозах (*Paramphistomum spp.*, *Liorchis scotiae*), нематодозах травного каналу (*Bunostomum spp.*, *Haemonchus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Ostertagia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Trichostrongylus spp.*) та монезіозі (*Moniezia spp.*) - 1 таблетка на 40 кг маси тіла тварини, при фасціолозі - 1 таблетка на 60 кг маси тіла тварини;

— Вівці, кози при фасціолозі (*Fasciola spp.*), стронгілятозах травного каналу (*Bunostomum spp.*, *Chabertia ovis*, *Oesophagostomum spp.*, *Ostertagia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Trichostrongylus spp.*) та монезіозі (*Moniezia spp.*) з розрахунку - 15 мг оксиклозаніду на 1 кг маси тіла, в т.ч.: ягнята до 15 кг - ¼ таблетки, вівці від 15 до 30 кг - ½ таблетки, вівці, барани більш 30 кг - 1 таблетка.

Дегельмінтизацію тварин проти статевозрілих трематод проводять в листопаді-грудні, проти статевонезрілих трематод - за показаннями.

Спеціальної дієти і застосування послаблюючих засобів перед дегельмінтизацією не потрібно.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не слід застосовувати препарат разом з іншими антгельмінтиками, в тому числі з пірантелом, морантелом, а також з фосфорорганічними сполуками. У тварин, які мають в анамнезі захворювання печінки, препарат не застосовується.

Побічна дія

Побічних явищ та ускладнень при застосуванні препарату згідно з цією інструкцією, як правило, не спостерігається. У рідкісних випадках у чутливих до компонентів препарату тварин, а також при передозуванні можливі індивідуальні реакції (пригнічений стан, відмова від корму, надмірне слиновиділення, діарея, нудота, коліки), які мимовільно проходять і не вимагають застосування лікарських засобів.

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяється не раніше, ніж через 15 діб після дегельмінтизації. При вимушеному забої раніше встановленого терміну, м'ясо може бути використане в корм хутровим звірам або для переробки на м'ясо-кісткове борошно.

Молоко забороняється використовувати в харчових цілях протягом 7 діб після дегельмінтизації. Отримане раніше встановленого терміну молоко може бути використане після кип'ятіння в корм тваринам.

Форма випуску

Поліетиленові або поліпропіленові банки по 50 та 100 таблеток, блістери по 12 таблеток, 2 блістери пакуються у картонну коробку.

Зберігання

У сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 2°C до 25°C.

Термін придатності - 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення та виробник

ТОВ «ВП «Укрзооветпромлоста»

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1.

www.ukrzoovet.com.ua



Для застосування
у ветеринарній
медицині

