



ukrzoovet.com.ua

Регистрационное
свидетельство
№ АВ-01191-01-10

ПИПЕРАЗИН 45%

(порошок для перорального применения)
листок-вкладыш

Описание

Белый мелкокристаллический порошок.

Состав

100 г препарата содержит: пиперазина цитрат - 45 г.

Вспомогательные вещества: лактоза.

Фармакологические свойства

АТСvet код QP52 антигельминтные ветеринарные препараты, (QP52AH01 пиперазин).

Препарат действует губительно на личиночные и взрослые формы гельминтов, нарушает у нематод нервно-мышечную регуляцию, вызывая гиперполяризацию мембран нервных клеток и паралич, ингибирует сукцинатдегидрогеназу, каталазу, ацетилхолинэстеразу. Быстро всасывается в пищеварительном тракте. Выделяется из организма, в основном, с мочой на протяжении 24 часов. Низкая токсичность на организм животных и птицы позволяет скармливать препарат группе животных с кормом.

Применение

Лечение крупного рогатого скота, лошадей, свиней, плотоядных животных (пушных зверей, собак, кошек), кроликов, птицы (кур, уток, гусей) при гельминтозах:

Виды животных	Гельминтозы	Вид нематод
Крупный рогатый скот (в т.ч. телята)	Неоаскароз	Neoascaris sp.
Лошади	параскароз, оксиуроз	Parascaris equorum., Oxyuris equi.
Плотоядные животные (собаки, кошки и пушные звери)	токсокароз, токсаскаридоз, анкилостомоз, унцинариоз	Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala.
Кролики (в т.ч. молодняк)	Пасалуроз	Passalurus ambiguus
Свиньи	аскароз, эзофагостомоз	Ascaris suum, Oesophagostomum spp.
Птица (куры, утки, гуси)	аскаридиоз, гангулетеракидоз, амидостомоз, тетрамероз	Ascaridia galli, Ganguleterakis dispar, Amidostomum anseris, Tetrameres fissispina.

Дозировка

Препарат применяется перорально с питьевой водой в следующих дозах:

Виды животных	Гельминтозы	Дозы в г/кг	Способ введения
Крупный рогатый скот (в т.ч. телята)	неоаскароз	0,4-0,6 (не больше 160 г на голову)	однократно
Лошади	параскароз, оксиуроз	0,4-0,6 (не больше 160 г на голову)	двукратно
Плотоядные животные (собаки, кошки и пушные звери)	токсокароз, токсаскаридоз анкилостомоз, унцинариоз	0,2-0,3	однократно
Кролики (в т.ч. молодняк)	пасалуроз	1,0 0,2-0,4	внутренне, 2 суток подряд после 18-24 часовой голодной диеты
Свиньи	аскароз эзофагостомоз	0,6	2 суток подряд в утреннее кормление
Птица (куры, утки, гуси)	аскаридиоз, гангулетеракидоз, амидостомоз, тетрамероз	0,5-1,0	двукратно, через сутки

Противопоказания

Повышенная чувствительность к пиперазину, заболевания печени, почечная недостаточность.

Предостережение

Убой животных на мясо и использование яиц разрешается через 4 суток, а употребление молока в пищу людям через 24 часа после последнего применения препарата. В случае убоя прежде установленного срока, мясо используют для кормления плотоядных животных или для изготовления мясокостной муки, а молоко выпаивают непродуктивным животным.

Форма выпуска

Полиэтиленовые банки или полиэтиленовые или ламинированные пакеты по 2, 15, 100, 500 г.

Хранение

В сухом и защищенном от света месте при температуре от 10°C до 25°C.

Срок годности - 3 года.

Владелец регистрационного удостоверения:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпочтач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua

Производитель готового продукта:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпочтач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua