



ПРИСИПКА ДЛЯ РАН **(порошок для нанесення на шкіру)** листівка-вкладка

Опис

Однорідний порошок від світло-жовтого до жовтого кольору із специфічним запахом ксероформу.

Склад

100 г препарату містить діючі речовини:

ксероформ – 5 г

стрептоцид – 5 г

Допоміжні речовини: тальк, крохмаль кукурудзяний.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QD06 – Антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для місцевого застосування. QD06BA99 – Сульфаніаміди, у комбінаціях.

Ксероформ має в'яжучі, підсушуючі властивості, звужує судини, зменшує ексудацію, знижує чутливість і послаблює запальні процеси. Сильний антисептик. Дія ксероформу полягає у взаємодії з білками тканин із утворенням альбумінатів, які подібно захисній плівці оберігають чутливі нервові закінчення від подразнення, а також у звуженні судин, зменшенні їх проникності (зменшується ексудація) та інгібуванні ферментів; взаємодія з білками мікроорганізмів пригнічує їхню життєдіяльність.

Стрептоцид відноситься до сульфаніамідних сполук. Він характеризується широким спектром антимікробної дії проти грампозитивних (*Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, та інші) і грамнегативних (*Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.* та інші) мікроорганізмів, але майже неактивний по відношенню до стафілококів. Стрептоцид діє бактеріостатично, перешкоджаючи використанню пара-амінобензойної кислоти мікроорганізми для синтезу дигідрофолієвої кислоти, яка бере участь у синтезі піримідинових основ ДНК та РНК мікробної клітини.

Ксероформ та стрептоцид при застосуванні на шкіру не всмоктуються в системний кровоток, діють тільки поверхнево та не проявляють резорбтивного ефекту.



Застосування

Лікування великої рогатої худоби, коней, овець, кіз, свиней, собак та котів при захворюваннях шкіри (екзема, дерматит, виразка), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до стрептоциду та ксероформу. Для обробки післякастраційних ран та попередження ускладнень після кастрації.

Дозування

Зовнішньо. За необхідності ушкоджену ділянку шкіри очищують та припудрюють препаратом та 2–3 см навколо неї. Ушкоджені ділянки обробляють 1–2 рази на добу до загоєння.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість, наявність алергічної реакції до стрептоциду та ксероформу, ниркова або печінкова недостатність. Не рекомендується використовувати під час вагітності та лактації.

Застереження

Побічна дія

Препарат не викликає ускладнень. За підвищеної чутливості можливі алергічні реакції.

Особливі застереження при використанні

Не дозволяти тварині злизувати препарат.

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не рекомендується використовувати під час вагітності та лактації.

Взаємодія з іншими засобами або інші форми взаємодії

Препарат несумісний з новокаїном та препаратами, що легко відщеплюють сірку (гіпосульфит натрію, глауберова сіль). Присутність сечовини підсилює дію сульфаніламідів.

Форма випуску

Поліетиленові банки або поліетиленові чи ламіновані пакети по 50 та 500 г, флакон з полімерного матеріалу зі вставкою-крапельницею 10 г, вкладений у картонну коробку.

Зберігання

У сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 2 до 25 °С, у герметично закритій упаковці.

Термін придатності – 3 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту:

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка,

Бучанський р-н, Київська обл., 08030, Україна,

www.ukrzoovet.com.ua

