



РОЗЧИН ЙОДУ 5%

(розчин для зовнішнього застосування)

листівка-вкладка

Опис

Прозора у тонкому шарі рідина червоно-бурого кольору.

Склад

100 мл препарату містять йоду 5,0 г;

Допоміжні речовини: калію йодид, концентрат естери-сивушний (КЕС), вода очищена.

Фармакологічні властивості

ATCvet код QD08A, антисептики і дезінфектанти. QD08AG03 - Йод.

В основі препарату - елементарний йод, що належить до категорії галогеновмісних антисептиків. Препарат має широкий спектр антибактеріальної дії по відношенню до *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Neisseria spp.*, *Escherichia coli*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Chlamydia*, неспороутворюючих анаеробів, вірусів герпесу та вітряної віспи (*Herpesviridae*).

Окрім протимікробної дії, він характеризується також відволікаючим та місцево-подразнювальним ефектами.

При нанесенні на шкіру з препарату повільно й рівномірно вивільняється активний йод, який окислює амінокислоти ферментів і трансмембранні білки патогенних мікроорганізмів.

Проникаючи, йод активно впливає на обмін речовин, посилює процеси дисиміляції. Діє подразнює при хронічних запаленнях суглобів, сухожильних піхв, м'язів, шкіри.

Із організму йод виводиться через нирки, бронхіальні, слинні і молочні залози.

Застосування

Застосовують великий рогатій худобі, коням, вівцям, козам, свиням, собакам, котам як антисептичний, подразнювальний засіб при інфекційно-запальних захворюваннях шкіри, для обробки операційного поля, для профілактики інфікування невеликих ушкоджень цілісності шкіри.

Дозування

Застосовується зовнішньо. Обробку поверхні шкіри проводять однократно. Уражена ділянка обробляється по краям рани змоченим ватним або марлевым тампоном з незначною кількістю препарату. Для більш глибокого проникнення йоду рекомендують шкіру попередньо обезжирити мильним розчином.

При обробці операційного поля шкіру двічі протирають стерильним марлевым тампоном, змоченим у розчині йоду.

Повторну обробку протягом доби бажано не проводити, надлишок активного йоду може викликати хімічний опік.



Протипоказання

Підвищена чутливість до йоду. Також препарат протипоказаний при трофічних виразках.

Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

При передозуванні можливі явища йодизму (нежить, сльозотеча, слинотеча, набряк повік).

Терапія симптоматична.

Застереження

Особливі застереження при використанні

Обережно застосовувати йод на слизові оболонки, оскільки етанол, що міститься в препараті, може спричинити сильне подразнення.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

Новонародженим тваринам і молодняку застосовувати розчин йоду слід з обережністю, щоб уникнути хімічних опіків.

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Вагітним тваринам застосовувати розчин йоду слід з обережністю, щоб уникнути хімічних опіків.

Взаємодія з іншими засобами або інші форми взаємодії

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, що містять органічні сполуки, може спостерігатися денатурація білкових компонентів. Лужне або кисле середовище, присутність жиру, гною, крові - ослаблення антисептичної активності.

Спеціальні застереження

Побічних явищ, як правило, не спостерігається. При повторних і частих змащувань розчином йоду протягом доби, а також при тривалому використанні на великих поверхнях можливі запальні реакції та опіки шкіри.

Період виведення (каренція)

При зовнішньому застосуванні в організм потрапляє незначна кількість препарату, тому період виведення не визначається. Продукцію тваринного походження використовують без обмежень.

Форми несумісності (основні)

Несумісний з ефірними маслами, розчином аміаку, брильянтовим зеленим.

Несумісний з дезинфікуючими ветеринарними лікарськими засобами, що містять ферменти, ртуть, луги, відновники.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

При роботі з препаратом необхідно дотримуватися загальних ветеринарно-санітарних правил. Інших застережень не має.

Форма випуску

Флакони, пляшки темні скляні або з полімерних матеріалів по 50, 100, 500 мл та каністри з полімерних матеріалів по 10 л.

Зберігання

У герметично закритій упаковці виробника у сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 5 °С до 25 °С.

Термін придатності - 3 роки.

**Власник реєстраційного посвідчення
та виробник готового продукту**

ТОВ «ВГП «Укрзооветпромполстач»

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1

ukrzoovet.com.ua

Для застосування
у ветеринарній медицині

N

