



СЕПТОВЕТ ФОРТЕ

порошок для перорального застосування

листівка-вкладка

Опис

Порошок білого або злегка кремового кольору.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини:

Сульфадимідин натрію – 125 мг;

Сульфадіазин натрію – 125 мг;

Триметоприм, у формі лактату – 50 мг.

Допоміжні речовини: лактоза

Фармакологічна дія

АТС vet класифікаційний код QJ01 – Антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01EW30 - Комбінації сульфаніламідів та триметоприму.

СЕПТОВЕТ ФОРТЕ – комплексний препарат, до складу якого входять сульфаніламідів і триметоприм. Активні компоненти мають синергічну дію, проявляють виражений антибактеріальний ефект.

СЕПТОВЕТ ФОРТЕ має широкий спектр антибактеріальної дії щодо більшості грамположитивних і грамнегативних мікроорганізмів, включаючи *Actinomyces spp.*, *Escherichia coli*, *Clostridium spp.*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*, *Bacillus anthracis*, *Pasteurella spp.*, *Vibrio spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Shigella spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Klebsiella spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Bordetella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Brucella spp.* а також найпростіші *Toxoplasma spp.*

Механізм дії сульфаніламідів обумовлений конкурентним антагонізмом з параамінобензойною кислотою (ПАБК), пригніченням дигідроптероатсинтетази, порушенням синтезу тетрагідрофолієвої кислоти, необхідної для синтезу пуринів та піримідинів.

Механізм дії триметоприму пов'язаний з пригніченням ферменту дигідрофолатредуктази у процесі синтезу тетрагідрофолієвої кислоти. Це призводить до виснаження фолатів, основного кофактору синтезу нуклеїнових кислот, у результаті продукція нуклеїнових кислот та білка бактерій порушується.

При комбінованій дії порушується синтез фолієвої кислоти на двох послідовних стадіях, що призводить до порушення синтезу нуклеотидів та обумовлює синергічну бактерицидну дію комбінації сульфаніламідів та триметоприму.

При пероральному застосуванні СЕПТОВЕТ ФОРТЕ активні речовини швидко всмоктуються із шлунково-кишкового тракту та проникають у всі органи та тканини організму, досягаючи максимальних концентрацій через 2-3 години та зберігаючись у терапевтичних концентраціях протягом 24 годин після одноразового застосування.

Сульфаніламідів швидко абсорбуються з травного каналу (переважно в тонкому кишечнику), на 75-86%(сульфадимідин) і 10-20% (сульфадіазин) зв'язуються з білками плазми. Добре проникають у тканини та рідини організму (в т.ч. легені, ліквор), швидко виводиться з організму, період напіввиведення становить 7 год. Елімінація здійснюється переважно нирками шляхом клубочкової фільтрації. У печінці частково піддається біотрансформації (ацетилюванню) і виводиться з жовчю.

Абсорбція триметоприму з травного каналу швидка і майже повна (90-100%). Зв'язування з білками плазми становить 45%. Швидко розподіляється в тканинах і рідинах організму. Триметоприм проходить через плаценту, проникає в молоко. Нирками виводиться (50-60%) протягом 24 год в основному шляхом клубочкової фільтрації та канальцевої секреції, причому 80-90% - у незміненому вигляді, решта - у вигляді неактивних метаболітів. Невелика кількість (4%) виводиться з жовчю.



Застосування

Телята віком до 2 місяців: лікування тварин, хворих на бронхопневмонію, гастроентерит, диспепсію, пастерельоз, сальмонельоз, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до складових препарату.

Ягнята віком до 2 місяців: лікування тварин, хворих на бронхопневмонію, інфекційну септицемію, анаеробну дизентерію, сальмонельоз, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до активних складових препарату.

Свині: лікування тварин, хворих на атрофічний риніт, бешиху, дизентерію, сальмонельоз, ензоотичну пневмонію, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до активних складових препарату.

Кролі: лікування тварин, хворих на інфекційний риніт, еймеріоз, гастроентерит, пастерельоз, пневмонію, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до активних складових препарату.

Свійська птиця (індики, кури, качки, гуси): лікування птиці, хворої на інфекційний бронхіт, пастерельоз, сальмонельоз, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до активних складових препаратів.

Дозування

Перорально з сухими, вологими кормами (замінником молока) або питною водою у дозі 1,0 г препарату на 10 кг маси тіла.

Телятам, ягнятам і свиням задають препарат у перший день лікування дворазово з інтервалом 12 годин, наступні дні – одноразово, протягом 4-6 діб.

Лікування птиці та кролів проводиться індивідуально в дозі 1 г препарату на 10 кг маси тіла або груповим методом 1 г/л води для напування: у перший день лікування подвійна доза, у наступні – стандартна, курс 4-6 діб. Лікувальний розчин для напування готують щодня, із розрахунку потреби птиці, щоб не лишалось залишків води. У період лікування птиці розчин із препаратом має бути єдиним джерелом питної води.

У тяжких випадках захворювання курс лікування продовжують до 8 діб.

Протипоказання

Не застосовувати при підвищеній чутливості до сульфаніламідних препаратів, а також при захворювання органів кровотворення, гострому гепатиті, нефриті.

Не застосовувати жуйним тваринам з функціонально розвиненими передшлунками.

Застереження

Побічна дія

При довготривалому використанні препарату можливе виникнення алергічних реакцій (шкірні висипи, кропивниця, свербіж), кристалоурія, зміни в картині крові (лейкопенія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія).

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Забороняється застосування препарату одночасно з параамінобензойною кислотою, прокаїном та іншими місцевими анестетиками. Також препарат не повинен застосовуватися з вітамінами групи В (нікотинамід, фолієва кислота, холін) через їх антагоністичний вплив на сульфаніаміди.

Використання під час вагітності, лактації

Не застосовувати самкам в останній третині вагітності та у період лактації, курям–несучкам, яйця яких використовують для споживання людьми.

Період виведення (каренції)

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 10 діб після останнього введення препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Ламіновані пакети по 15, 100 та 500 г.

Зберігання

У сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 5 до 25 °С у щільно закритій тарі.

Термін придатності

2 роки.

Виробник готового продукту:

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»
вул. Васильківська, 16, Київ, 03040, Україна
www.ukrzoovet.com.ua

А Лише для
ветеринарної
медицини

