



СВІЧКИ ЗООХЕЛС

(супозиторії ректальні)

листівка-вкладка

Опис

Супозиторії жовтого кольору торпедоподібної форми.

Склад

1 супозиторій (2,2 г) містить діючі речовини (мг):

бензокаїн (анестезин) 30,0;

ксероформ 25,0;

цинку оксид 12,5.

Допоміжні речовини: екстракт обліпіхи, ментол, ПЕГ-1500, ПЕГ-400.

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QC05A Інші ветеринарні препарати для лікування геморою та анальних тріщин для місцевого застосування.

СВІЧКИ ЗООХЕЛС - комплексний ветеринарний препарат, терапевтична дія якого зумовлена фармакологічними властивостями діючих речовин, що входять до його складу.

Бензокаїн – анестетик місцевої дії, який зворотно та локально підвищує поріг сприйняття та пригнічує провідність нервових волокон, знижує больову чутливість. Найбільш виражена дія спостерігається у волокнах больової чутливості та симпатичних постгангліонарних волокнах. Бензокаїн сповільнює мембранне проникнення іонів Na⁺ та K⁺, що знижує чутливість нервового волокна. Дія настає через 1 хвилину після застосування препарату і триває до 20 хвилин. Після всмоктування бензокаїн гідролізується у крові під дією естераз і холінестерази до параамінобензойної кислоти і діетиламіноетанолу. Приблизно 80% параамінобензойної кислоти у незмінній або кон'югованій формі і 30% діетиламіноетанолу виводяться з організму нирками. Ксероформ має в'яжучі, підсушуючі властивості, звужує судини, зменшує ексудацію, знижує чутливість до подразнень і послаблює запальні процеси. Сильний антисептик. Дія ксероформу полягає у взаємодії з білками тканин із утворенням альбумінатів, які подібно захисній плівці оберігають чутливі нервові закінчення від подразнення, а також у звуженні судин, зменшенні їх проникності (зменшується ексудація) та інгібуванні ферментів; взаємодія ксероформу з білками мікроорганізмів пригнічує їхню життєдіяльність.

Цинку оксид має антиексудативну, адсорбуючу, антисептичну та підсушуючу дії. Перша фаза ранового процесу (гідратації), що починається відразу ж після травми, включає судинні зміни, лізис некротизованих тканин та очищення рани від них. Цинку оксид у кислому середовищі при запаленні у I фазі ранового процесу на поверхні рани утворює альбумінати, які захищають рецептори від подразнення і сприяють загоєнню рани. При нанесенні препарату на уражену поверхню знижуються прояви запалення (ексудація, біль, набряк, гіперемія, функціональні порушення), утворюється захисний бар'єр від дії подразнюючих факторів, пришвидшуються регенеративні процеси. Цинку оксид має надзвичайно низьку здатність проникнення у кров.

Усі компоненти препарату, не всмоктуються в системний кровоток (або проникають в незначній кількості - бензокаїн), діють місцево та не проявляють резорбтивного ефекту.

Виводяться з фекаліями.



Застосування

Лікування котів і собак, хворих на параанальний синусит і проктит.

Дозування

Вводять по 1 супозиторію у пряму кишку після очисної клізми або самостійного випорожнення 1-2 рази на добу.

Курс лікування 7-14 діб.

Застереження

Побічна дія

Дисконфорт у задньому проході, послаблюючий ефект, алергічні реакції. При тривалому застосуванні можуть розвинути реакції з боку крові (метгемоглобінемія). Підвищена чутливість до компонентів препарату. При тривалому застосуванні препарату необхідний контроль показників крові.

Форма випуску

Супозиторії ректальні по 2,2 г № 10, (по 5 супозиторіїв в блістері, 2 блістери в паці).

Зберігання

У сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 10 до 25 °С.

Термін придатності - 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка,

Бучанський р-н, Київська обл., 08030, Україна,

www.ukrzoovet.com.ua

Виробники готового продукту

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка,

Бучанський р-н, Київська обл., 08030, Україна,

www.ukrzoovet.com.ua



для застосування
у ветеринарній
медицині

