

Вода для выпойки кошек "ЗооХелс»

кормовая добавка

Состав

100 мл препарата содержит действующие вещества:

Кислоту

Аскорбиновую - 0,001 г;

Наночастицы

Серебра - 0,25 мг.

Форма выпуска

Пэтф бутылки:

1000 мл

фармакологические свойства

Средство, которое предупреждает увеличение и появление мочевых конкрементов.

При употреблении воды, вследствие установления значения рН мочи, создаются благоприятные условия для прекращения роста бактерий и ингибируется преципитация кристаллов струвита путем снижения доступности ионов фосфата.

Аскорбиновая кислота обладает выраженными антиоксидантными свойствами, регулирует иммунологические реакции.

Применение

Для профилактики и как вспомогательное средство при лечении заболеваний мочевых путей, сопровождающихся мочекаменной болезнью у кошек.

Дозировка

Средняя суточная доза определяется индивидуально и может колебаться от 60 до 150 мл.

Для профилактики рецидивов кормовую добавку назначают курсами, продолжительность и частоту которых устанавливают индивидуально для каждого животного.

Предостережение

Во время применения препарата не назначать лекарственные препараты для подкисления мочи.

Хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25°С. Допускается наличие осадка.

Срок годности - 12 месяцев

11. Препарати для дрібних тварин ТМ «ЗооХелс»

Вода для випоювання котів «ЗооХелс»

кормова добавка

склад

100 мл препарату містить діючі

речовини: кислоту

аскорбінову - 0,001 г; наночастинки

срібла - 0,25 мг.

Форма випуску

ПЕТФ пляшки:

1000 мл



Фармакологічні властивості

Засіб, який попереджає збільшення і появу сечових конкрементів.

При вживанні води, внаслідок встановлення значення рН сечі, створюються сприятливі умови для припинення росту бактерій і інгібується преципітація кристалів струвіта шляхом зниження доступності іонів фосфату.

Аскорбінова кислота володіє вираженими антиоксидантними властивостями, регулює імунологічні реакції.

Застосування

Для профілактики і як допоміжний засіб при лікуванні захворювань сечових шляхів, що супроводжуються сечокам'яною хворобою у котів.

Дозування

Середня добова доза визначається індивідуально і може коливатися від 60 до 150 мл.

Для профілактики рецидивів кормову добавку призначають курсами, тривалість і частоту яких встановлюють індивідуально для кожної тварини.

Застереження

Під час застосування препарату не призначати лікарські препарати для підкислення сечі.

зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від 5 до 25°C.

Допускається наявність осаду.

Термін придатності - 12 місяців.