



ВОРМІКІЛ суспензія

(суспензія для перорального застосування)

листівка-вкладка

Опис

Суспензія від світло-жовтого до жовтого кольору. При зберіганні допускається випадання осаду, який при збовтуванні розчиняється.

Склад

Один мілілітр препарату містить діючі речовини:

пірантелу памоат - 45 мг, фебантел - 45 мг, празіквантел - 15 мг.

Допоміжні речовини: полівінілпіролідон, гліцерин, підсолоджувач, твін-80, ксантанова камедь, бензоат натрію, калію сорбат, лимонна кислота, ароматизатор, вода очищена.

Фармакологічні властивості

ATC vet QP52 FF 51, Група празіквантел, комбінація

ВОРМІКІЛ суспензія відноситься до комбінованих антгельмінтних ветеринарних препаратів. Спектр дії препарату ґрунтується на фармакологічній дії складових препарату – празіквантелу, фебантелу і пірантелу памоату. Препарат має антигельмінтну дію на нематод травного каналу (*Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxocara mystax*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Ancylostoma caninum*) і цестод (*Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*, *Mesocestoides lineatus*, *Diphyllobotrium latum*), що паразитують у собак і котів.

Празіквантел активний щодо цестод (стожкових гельмінтів), швидко всмоктується всією поверхнею паразитів і рівномірно розподіляється по їхньому тілу. Празіквантел підвищує проникність мембран клітин паразита для іонів кальцію, викликає підвищення м'язової активності, що призводить до скорочення мускулатури та спастичного паралічу, викликає руйнування зовнішньої кутикули у дорослих форм цестод. Часто мертві цестоди повністю перетравлюються у травному каналі і не виявляються у фекаліях.

В організмі ссавців празіквантел швидко всмоктується у травному каналі. Найвища його концентрація у плазмі крові спостерігається через 1-2 години після введення, швидко метаболізується і виводиться до 80% у вигляді метаболітів нирками впродовж 4 діб, при цьому 90% виводиться у перші 24 год.

Фебантел, що входить до складу препарату, належить до групи пробензімідазолів. Активний по відношенню до нематод (круглих гельмінтів), зокрема до: *Ancylostoma spp.*, *Uncinaria spp.*, *Toxocara spp.*, *Toxascaris spp.*, *Trichuris spp.* Механізм дії фебантелу полягає в порушенні функції мікротубулярного апарату клітин паразита, викликаючи ушкодження тубулінового білка, зниженні активності фумаратредуктази, яка є ключовим ферментом в енергетичному обміні гельмінтів, припиненні транспорту і всмоктування глюкози, що викликає загибель нематод. Фебантел всмоктується в кишечнику, метаболізується в печінці і виділяється з жовчю в просвіт кишечника, де частково відбувається його повторна резорбція, з організму виводиться як у незмінній формі, так і у вигляді декількох метаболітів з фекаліями і сечею.

Пірантелу памоат (ембонат) активний щодо нематод (круглих гельмінтів), діє на їх холінергічні рецептори, викликаючи незворотній спастичний параліч. Нематоди, які загинули виводяться з організму тварин назовні перистальтичними рухами кишківника. Проте пірантел не активний щодо міграційних личинкових стадій гельмінтів.

В організмі ссавців пірантел слабо абсорбується у травному каналі і після ведення всередину *per os* у дозі 10 мг/кг маси тіла його концентрація в плазмі крові становить 0,005-0,13 мкг/мл через 1-3 год. Пірантел, що абсорбувався до системи кровообігу, частково метаболізується в печінці до N-метил-1,3-пропандіаміну.

ВОРМІКІЛ суспензія за ступенем впливу на організм відноситься до речовин малонебезпечних (четвертий клас небезпеки), в рекомендованих дозах не чинить ембріотоксичної, тератогенної і сенсibilізуючої дії, добре переноситься собаками і котами різних порід та віку.



Застосування

ВОРМІКІЛ суспензію призначають дорослим собакам і котам; цуценятam і кошенятam з 3-тижневого віку з профілактичною та лікувальною метою при нематодозах (токсокароз, токсаміоз, анкілостомоз, унцинаріоз, трихуроз), цестодозах (теніодоз, дипілідіоз, ехінокоз, діфілоботріоз, мезоцестодоз) і змішаних нематодо-цестодозних інвазіях.

Дозування

ВОРМІКІЛ суспензію застосовують тваринам індивідуально, однократно з лікувальною і профілактичною метою, під час ранкового годування з невеликою кількістю корму або вводять примусово на корінь язика за допомогою шприца-дозатора з розрахунку:

Вид тварин	Доза препарату/маса тіла
Коти, кошенята, цуценята дрібних порід	0,3 мл на 1 кг
Цуценята середніх і великих порід, дорослі собаки	1 мл 3 кг

Перед застосуванням флакон з препаратом необхідно ретельно збовтати.

З лікувальною метою, а також з метою профілактики при груповому утриманні тварин (розплідники, притулки, віварії), при нематодозах обробку проводять один раз на добу дворазово з інтервалом 14 діб; при цестодозах і змішаних нематодо-цестодозних інвазіях один раз на добу протягом трьох діб поспіль. Попередньої голодної дієти і застосування послаблюючих засобів не потрібно. З профілактичною метою дегельмінтизацію проводять щоквартально, а також перед кожною вакцинацією. Вагітним самкам препарат призначають за 3 тижні до передбачуваних пологів з обережністю, під наглядом ветеринарного лікаря, лактуючим самкам - через 2-3 тижні після пологів.

Протипоказання

Протипоказанням до застосування препарату є індивідуальна непереносимість компонентів препарату (у тому числі в анамнезі). ВОРМІКІЛ суспензію не слід застосовувати самкам в першій половині вагітності, цуценятam і кошенятam молодше 3-тижневого віку, виснаженим, хворим на інфекційні хвороби і одужуючим тваринам.

Застереження

У деяких тварин можливі порушення в роботі шлунково-кишкового каналу (діарея, блювота), посилення слиновиділення, які зникають самостійно без застосування лікарських засобів. При першому застосуванні препарату у котів можлива гіперсалівація, яка самостійно проходить.

Форма випуску

ВОРМІКІЛ суспензія розфасована по 5 та 10 мл в полімерні флакони, упаковані поштучно в картонні коробки в комплекті з шприцом-дозатором.

Зберігання

У сухому темному недоступному для дітей місці за температури від 5°C до 25°C.

Термін придатності препарату - 2 роки.

Термін придатності після першого відкриття флакона - не більше 3 місяців при зберіганні за температури 2°C - 8°C.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ «ВП «Укрзооветпромстач»

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1

www.ukrzoovet.com.ua

Назва та місцезнаходження виробника

ТОВ «ВП «Укрзооветпромстач»

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1

www.ukrzoovet.com.ua

Для застосування
у ветеринарній медицині

А

