



ЗООВІТ-3
РОЗЧИН ВІТАМІНІВ А, Д₃, Е В ОЛІЇ
(розчин для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Рідина прозора масляниста від світло-жовтого до світло-коричневого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

вітамін А 10 000 МО;
вітамін D₃ 15 000 МО;
вітамін Е 20 мг.

Допоміжна речовина: олія рослинна.

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QА11С Вітаміни А і D, включаючи їх комбінації.

Дія препарату зумовлена властивостями вітамінів, які входять до його складу. **Вітамін А** стимулює ріст і резистентність організму, підтримує захисні функції епітелію слизових оболонок дихальних і сечових шляхів, шлунково-кишкового тракту, функціонування органів зору. За нестачі вітаміну А порушуються зір, репродуктивна функція, розвивається гастроентерит, народжується нежиттєздатний молодняк, затримується його ріст.

Вітамін D₃ регулює фосфорно-кальцієвий обмін, стимулює абсорбцію обох макроелементів у кишечнику і реабсорбцію їх із первинної сечі, синтез білків органічного матриксу кісткової тканини та його мінералізацію. За нестачі вітаміну D розвиваються рахіт, остеодистрофія, перед- і післяродове залежування та інші хвороби.

Вітамін Е бере участь в обміні білків, жирів і вуглеводів, запобігає окисненню ненасичених жирних кислот, неплідності самок, стимулює сперміогенез та розвиток плода. За його нестачі спостерігаються енцефаломаліяція, ураження м'язової тканини (міопатія, білом'язова хвороба) і печінки.

Застосування

Профілактика і лікування тварин за остеодистрофії та рахіту, післяродової гіпокальціємії та гіпофосфатемії, перед- і післяродового залежування, затримання посліду, субінволюції матки, ендометриту, бронхіту і бронхопневмонії, переломів кісток.

При застосуванні препарату раціони повинні бути збалансовані за кальцієм, фосфором, цинком, кобальтом, міддю і манганом.

Дозування

Дози препарату розраховані за вітаміном D₃.

Вид тварин, фізіологічні параметри	Перорально, крапель на добу	
	доза профілактична	доза лікувальна
Молодняк великої рогатої худоби, на 100 кг маси тіла	10–12	40
Поросята (до 20 кг)	2	5–6
Свиноматки супоросні	7–8	20

Свиноматки лактуючі	10–12	25–30
Лошата 6–12 міс.	10	40
Кобили лактуючі	25	60
Спортивні коні	15	40
Собаки молодняк, на 10 кг маси тіла	1	3–4
Собаки дорослі, на 20 кг маси тіла	1	4–5
Кури-несучки, на 1 кг комбікорму	8	20
Молодняк птиці, на 1 кг комбікорму	4	10

Для лікування препарат застосовують упродовж 3–4 тижнів разом із кормом.

Препарат, використаний у наведених дозах, не може бути ефективним для профілактики і лікування А-вітамінної недостатності. Для повного забезпечення потреби у вітаміні А необхідно додатково застосовувати його препарати.

Протипоказання

Не застосовувати при гіпервітамінозах!

Не застосовувати разом із солями тривалентного заліза (вітамін Е окиснюється)!

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Вітамін D₃ при застосуванні з вітамінами А і С сприяє профілактиці простудних захворювань; засвоєнню вітаміну А.

Наявність у складі кормів надмірної кількості ненасичених жирних кислот, а також наявність заліза, цинку, мангану і міді знижує активність вітамінів, що містяться в препараті.

Форма випуску

Скляні флакони, об'ємом по 10, 50, 100 і 1000 мл.

Зберігання

У сухому темному місці при температурі від 5 до 15 °С.

Термін придатності — 2 роки

Власник реєстраційного посвідчення

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,
Тел. 0800211201

Виробник готового продукту

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,
Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua