



МАЗЬ САНОФІТ

листівка-вкладка

Опис

Однорідна мазь від світло-зеленого до зеленого кольору зі специфічним запахом.

Склад

100 г препарату містять (г):

хлорофіліпт	- 5,0;
ефірну олію евкаліпта	- 3,22;
ефірну олію лавра	- 1,21;
ефірну олію розмарину	- 0,16;
ефірну олію кедр	- 0,16;
камфору	- 0,16;
ментол	- 0,08.

Допоміжні речовини: вазелін білий, масло вазелінове.

Фармакологічні властивості

ATC-vet класифікаційний код: QD02A Дерматологічні ветеринарні препарати. Препарати із захисною і пом'якшувальною дією.

Завдяки комбінації діючих речовин препарат має антисептичну, протизапальну і протинабрякову дію.

Фармакологічна дія мазі, насамперед, обумовлена наявністю ефірних рослинних олій. Загальною властивістю їх є антисептична активність, що діє майже на всі групи мікроорганізмів (грампозитивні і грамнегативні коки, вібріони, віруси, найпростіші, мікроскопічні гриби). При тривалому застосуванні резистентність не розвивається. Це пояснюється руйнуючим впливом ефірних олій на цитоплазматичну мембрану, пошкодженням механізмів захисту і адаптації мікробної клітини. Антибактерійна активність олій лікарських рослин поєднується з цілковитою безпекою їх для макроорганізму.

Хлорофіліпт має протизапальну, антисептичну дію, антибактерійну активність по відношенню до антибіотикостійких стафілококів, знімає набряки, стимулює процеси кровотворення, регенерації тканин, фагоцитарну активність лейкоцитів і клітин сполучної тканини.

Камфора при місцевому застосуванні помірно подразнює нервові закінчення, при тривалій дії знижує чутливість рецепторів шкіри, зменшує міграцію лейкоцитів із судин у місце запалення. Діє бактериостатично, особливо на кокові форми мікроорганізмів.

Ментол підсилює місцеву дію рослинних ефірних олій, має заспокійливу, легку місцеву знеболювальну та антисептичну дію. При місцевому застосуванні звужує судини шкіри.

Мазь швидко всмоктується в місцях нанесення, підсилює місцевий кровообіг, активізує живлення, сприяє загоєнню мікротравм. Захищає шкіру вимені від шкідливих впливів навколишнього середовища (холоду, вологи, вітру), а також від укусів комах. Запобігає висиханню шкіри при частому митті, має легкий дезінфікуючий ефект, надає пружності, еластичності.

Застосування

Мазь Санوفіт застосовують зовнішньо місцево коровам, кобилам, вівцяматкам, козам:

– із профілактичною метою для попередження запальних процесів шкіри молочної залози, особливо при не дотриманні санітарно-гігієнічних вимог, порушенні правил машинного доїння;

– у комплексній терапії клінічно виражених форм субклінічного маститу (втирання мазі поєднують із масажем молочної залози тоді, коли масаж не є протипоказаним);

– для відлякування комах від вимені при випасанні худоби у літніх таборах;

– змазування тріщин дійок, а також при обвітрюванні, дерматитах, сонячних опіках, обмороженні вимені;

– попередження інфікування шкіри та захисту від потрапляння мікрофлори через дійковий канал (галактогенний шлях проникнення мікробів при маститах) за утримання тварин на забрудненій підстилці;

– у комплексній терапії серозного набряку вимені, папілом дійок та вимені, гематом, абитих місць;

– для масажу сфінктера дійкового каналу при лактореї (самовільному витіканні молока);

– при алергічних проявах та зуді шкіри вимені при укусах комах;

– у комплексній терапії флебітів, парафлебітів, лімфангітів, тендинітів.

Мазь Санофіт застосовують для обробки рук акушера або рукавиць акушера при наданні рододопомоги при фізіологічних або патологічних родах, змашування рук доярок та вим'я первісток при ручному роздоюванні.

Дозування

Мазь застосовують зовнішньо місцево.

Кількість препарату залежить від площі ділянки нанесення.

Вим'я та дійки після кожного здоювання змащують невеликою кількістю мазі. За потреби доярка змащує руки після доїння.

У комплексній терапії маститу при перших ознаках захворювання вим'я та дійки інтенсивно змащують і масажують до повного всмоктування мазі. Процедуру слід повторювати через кожні 4 години до зникнення клінічних ознак захворювання.

В інших випадках мазь наносять на уражені місця 2-3 рази на добу і втирають до повного її всмоктування. При тріщинах, опіках, укусах комах уражені місця змащують товстим шаром мазі. Процедуру повторюють до зникнення симптомів. Можна захищати змащені хворі місця бинтовою пов'язкою для уникнення додаткового їх травмування під час злизування мазі твариною.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Застереження

Уникати потрапляння препарату в очі.

Форма випуску

Банки з полімерних матеріалів по 20 та 200 г, туби з полімерних матеріалів по 50, 100 і 200 г.

Зберігання

Захищене від світла і недоступне для дітей місце, за температури від 8 до 25° С.

Термін придатності препарату — 2 роки.

Власник реєстраційного посвідчення

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,

Тел. 0800211201

Виробник готового продукту

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua